

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Абсаттарова Венера Кошкарбаевна, Коянбаева Света Худояровна

Медицинский Институт Каракалпакстана, 230105, Нукус, ул. Досназарова 108, Республика Узбекистан

E-mail: venera.absattarova@bk.ru

Ключевые слова: вирусные гепатиты; заболеваемость; интенсивный показатель; распространение; факторы передачи; профилактика

Введение.. Высокая заболеваемость вирусными гепатитами в Республике Каракалпакстан, в том числе вирусным гепатитом "А" детей в возрасте 3–14 лет, а так же распространение среди населения вирусного гепатита "В" является одним из актуальных задач.

Цель исследования. Изучение заболеваемости и факторов способствующих распространению вирусных гепатитов на территории Республики Каракалпакстан в 2016–2019гг.

Материалы и методы. исследования. Использованы материалы Управления санитарно эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Каракалпакстан, исследование проводилось с помощью аналитических и статистических методов.

Результаты. исследования. В течение 2016-года уровень заболеваемости вирусным гепатитом по сравнению с 2019-годом уменьшился в 1,5 раза (2016-году 1661 случай, интенсивный показатель 93,5, в 2019-году 1075 случаев, интенсивный показатель 57,9). Среди случаев вирусного гепатита вирусный гепатит "А" составляет 97,7%, вирусный гепатит "В" 1,8%, вирусный гепатит "С" 0,5% случаев. В 3 городах и районах республики зарегистрировано повышенная заболеваемость гепатитом "А" по сравнению с общереспубликанским показателем: (ВГ"А"-1051 случаев, интенсивный показатель на 100 тыс.населения составил-(56,6): в Тахиаташском районе 121 случаев (16,1), Турткульском районе-235 случаев (112,8), в городе Нукусе –226 случаев (72,2). В 98,4% (1034 случаев) были определены факторы заражения. Из них 11,4% — через пищевые продукты, 87,0% контактно-бытовым путем. В 1,6% случаев факторы передачи не были определены. На некоторых территориях в результате не качественного проведения эпидемиологического обследования очагов выявление факторов передачи инфекции находится на низком уровне например, Турткульском районе 3,4% (из 235 случаев 8), Нукусском районе 39,1% (из 23 случаев 9) не были определены факторы передачи. Заболеваемость вирусным гепатитом "В" в 2019 году по сравнению с 2016 годом заболеваемость вирусным гепатитом В снизилось в 1,3 раза. В 2016 году в республике зарегистрировано 24 больных (интенсивный показатель — 1,4), в 2019 году зарегистрировано 19 больных (1,0). Заболеваемость ВГ"В" в Тахиаташском районе-3 случая (интенсивный показатель — 4,1), Берунийском районе 3 случая (1,6), Амударьинском районе 5 случаев (2,6), Чимбайском районе-2 случая (1,7), что превышает средний показатель (и.п.-1,0) по республике. В результате проведения эпидемиологического обследования очагов ВГ"В" в 94,7% (18 случаев) были определены факторы передачи инфекции, в 5,3% случаев факторы передачи не выявлены. Ведущими факторами передачи ВГ"В" были: полученные различные манипуляции 41,4%, стоматологические процедуры 19%, бытовой контакт 10,3%, гинекологические вмешательства 15,0% , лабораторные процедуры 5,0% и 10,3% половой путь передачи.

Заключение. Выявлено, что заражение вирусным гепатитом "А" в 87,1% случаев произошло контактно-бытовым путем, гепатитом "В" в 79,0% случаев парентеральным путем. Основными профилактическими мерами при вирусных гепатитах является своевременное выявление и лечение больных, профилактика внутрибольничных заражений, вакцинация детей против гепатита "А"и"В" и своевременное проведение противоэпидемических мероприятия в очагах.