

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ОСТРЫМ КИШЕЧНЫМ ИНФЕКЦИЯМ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Абсаттарова Венера Кошкарбаевна, Санадова Джумагул Кутхожаевна

Медицинский Институт Каракалпакстана, 230105, Нукус, ул. Досназарова 108, Республика Узбекистан,

E-mail: venera,absattarova@bk.ru

Ключевые слова: острые кишечные инфекции ;дети; водоснабжение; профилактика

Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимает одно из ведущих мест в структуре инфекционной патологии. По данным ВОЗ, ежегодно диарейными заболеваниями страдают более 1 млрд. человек, значительную часть которых составляют дети до 5 лет (75–80%). Так если в 1981 годы в республике переболело 4047 человек, то в 1991 году этот показатель составил 5587 человек (в интенсивных показателях соответственно 423,1 и 529,0). В настоящее время благодаря проведению и осуществлению профилактических мероприятий заболеваемость ОКИ в республике значительно снизилась. Так в 2007 году в Каракалпакстане было зарегистрировано 2004 больных, в 2017 году 3788 больных, что 2,0–1,5 раза меньше, чем в 1981 и 1991 годы. В 2020 году интенсивный показатель заболеваемости составил –87,9 по сравнению с 2019 годом снизилось на 0,6 раза. Анализ заболеваемости в разрезе городов и районов за последние 2 года (2019–2020 г.г.) показали, что отмечается рост в г.Нукусе, Турткульском, Нукусском, Канлыккульском районах по сравнению с другими административными территориями республики.

Цель исследования. Изучить эпидемиологическую ситуацию по ОКИ в Республике Каракалпакстан

Материалы и методы. Использованы статистические и эпидемиологические данные Управления республиканского санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Результаты. В распространение ОКИ важное место занимает водный фактор. В структуре больных ведущее место занимают дети от 0-до 2-х лет (63,1%). Обеспеченность населения чистой питьевой водой составляет 61,5%, из них городское население-71,5%, сельское население-28,5%. Обеспеченность канализацией 31,1%. В 2020 году результаты мониторинга над коммунальными водопроводами по химическим показателям взято 2856 проб, из них не отвечает требованиям ГОСТа 614, что составляет 21,5%. По бактериологическим показателям проведены 2003 проб, из них 55 (2,7%) не соответствовали требованиям ГОСТ. Анализ показывает, что 2019–2020 годы не было зарегистрировано ни одного случая выделения холерных вибрионов 01 и не01 из водопроводной воды и пищевых продуктов.

В настоящее время в Республике Узбекистан с целью усиления мер борьбы и снижения заболеваемости утвержден и издан приказ № 122 от 25 марта 2015 года «О совершенствовании мероприятий по профилактике брюшного тифа, паратифа, сальмонеллеза и ОКИ среди населения республики».

Заключение. Для поддержания эпидемиологического благополучия по ОКИ в республике целесообразно осуществлять следующие мероприятия:

- уделять особое внимание обеспечения населения централизованным водоснабжением и канализацией.
- усилить бактериологический и химический контроль над объектами водоснабжения.
- организовать своевременный вывоз нечистот.
- усилить санитарно просветительскую работу населения по профилактике ОКИ.