

ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ

Абдукамилова М.К.

Научный руководитель: ассистент Рахматиллаева М.Ш.

Кафедра Госпитальная педиатрия № 1 с основаниями нетрадиционной медицины
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Актуальность исследования: в течение последних десятилетий наблюдается тенденция к неуклонному росту ревматических заболеваний в детской популяции. В структуре первичной заболеваемости ревматическими болезнями 56% принадлежит реактивным артритам [1].

Цели исследования: изучить особенности терапии реактивного артрита у детей с хроническим течением.

Материалы и методы: проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 32 детей с хроническим течением РеА, находившихся на лечении в клинике ТаШПМИ за период 2015–2018 гг.

Результаты: эффективность комбинированной терапии полиоксидонием и антибиотиком (левофлоксацин) при лечении хронического реактивного артрита, ассоциированного с хламидийной инфекцией, составила 70%. Через 6 месяцев после завершения терапии у 70% больных развилась клинико-лабораторная ремиссия. У этих детей перестал рецидивировать суставной синдром, полностью восстановилась функция суставов, нормализовались лабораторные показатели и перестали выявляться иммунологические маркеры хламидийной инфекции.

Выводы: больным с острым и хроническим течением реактивного артрита показано дифференцированное назначение противохламидийной терапии. Монотерапию антибиотиками или комбинированную терапию с использованием иммуномодулятора и антибиотика целесообразно назначать в зависимости от длительности заболевания и характера ранее проводимой терапии.

Литература

1. Алексеева Е.И., Жолобова Е.С. Реактивные артриты у детей. 2002.
2. Баранов А.А., Алексеева Е.И. Ревматические болезни у детей: проблемы и пути их решения. 2004.

РОЛЬ IGE И МЕДИАТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИМФОЦИТОВ В РАЗВИТИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА

Абророва Б.Т.

Научный руководитель: д.м.н. Алиева Н.Р.

Кафедра госпитальной педиатрии № 1 с основами нетрадиционной медицины
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Актуальность исследования: нарушения функции тонкой кишки одна из актуальных проблем педиатрии, остается нерешённой проблемой детской гастроэнтерологии. В патогенезе заболеваний значение отводится роли лимфатической системой кишечника, которая выполняет защитную, противовоспалительную и противоаллергическую функцию [1].

Цели исследования: изучение роли IgE и медиаторной активности лимфоцитов в развитии аллергического энтероколита.

Материалы и методы: обследованы 40 детей с аллергическим энтероколитом в возрасте от 6 месяцев до 4 лет. Контрольную группу составили 31 практические здоровые дети. Аллергический энтероколит установлен на основании тщательного сбора анамнеза, определения иммуноглобулина Е, определения антигенсвязывающих лимфоцитов.