

2. Безруких М.М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): учеб, пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. 2-е изд., доп. М: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. 496 с.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЛАКТАЦИИ

Поварова А.И.

Научный руководитель: к. м. н., доцент Баирова С.В.

Кафедра Поликлинической педиатрии им. академика А.Ф. Тура

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Актуальность исследования: по данным Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины на 2017 г. процент грудного вскармливания у детей 6 месяцев не превышает 40%. По данным Санкт-Петербурга — 35% [1].

Цели исследования: определить факторы, влияющие на становление лактации.

Материалы и методы: были опрошены 80 родильниц на послеродовом отделении Родильного дома № 1 (зав. отделением Фокина М.Н.). Сформированы 3 группы: 1 — хорошее становление лактации — 42 матери, 2 — замедленное становление — 31, 3 — не было молока — 7. Произведен анализ общих признаков и отличающихся во всех группах [2].

Результаты: в ходе проведенного исследования были выделены 3 группы: 1 группа (52,5%) — исключительно грудное вскармливание с первых дней жизни ребенка, 2 группа (42,5%) — матери докармливали детей искусственной смесью, 3 группа (5%) — дети на искусственном вскармливании. При анализе групп были выявлены следующие факторы, замедляющие процесс становления лактации: сомнение матери в способности кормить новорожденного грудным молоком: 1 группа — 23,9%, 2—44,7%, 3—71,4%; возраст первородящей матери после 30 лет: 1 группа — 14,3%, 2—29%, 3—71,4%; отсутствие прикладывания новорожденного к груди матери в родильном зале: 1 группа — 16,7%, 2—55,3%, 3—85,7%; оперативное родоразрешение — кесарево сечение: 1 группа — 7%, 2—45%, 3—43%; низкий процент посещения школы беременных: 1 группа — 26,2%, 2—19,4%, 3—14,3%.

Выводы: ведущими факторами, влияющими на успешное становление лактации, являются: возраст первородящей матери до 30 лет, раннее прикладывание к груди, способ родоразрешения — естественные роды, психологическая подготовка к родам и уверенность матери в способности поддержания грудного вскармливания.

Литература

1. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации, Москва, 2010.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА В ВОРОНЕЖЕ

Полухина А.Н.

Научный руководитель: к. м. н., ассистент Коротаева Н.В.

Госпитальная и поликлиническая педиатрия

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко

Актуальность исследования: неонатальный скрининг ВПС в современном мире является одним из важнейших комплексов профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление врождённых аномалий сердечно-сосудистой системы [2].

Цели исследования: оценить диагностическую значимость пульсоксиметрии и измерения АД для выявления жизнеугрожающих состояний новорождённых [1].