

- Пушкарёв В.А., Кулаковский Е.В., Хуснутдинов Ш.М., Мустафина Г.Т. Атипическая гиперплазия эндометрия (диагностика, клиника и лечение) // Креативная хирургия и онкология. 2004, № 3. С 22–26.
- Wang S., Wang Z., Mittal K. Concurrent endometrial intraepithelial carcinoma (EIC) and endometrial hyperplasia // Hum Pathol. 2015. Vol. 2, № 1. P. 1–4.

ЗАВИСИМОСТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ КРОВОПОТЕРИ ОТ ГРУППЫ КРОВИ, РЕЗУС ФАКТОРА И ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ

Адамов А.М., Адамова О.М.

Научные руководители: д.м.н., профессор Романенко Н.М., к.м.н., доцент Ткачева Н.Ю., врач-акушер-гинеколог Килесса М.А., врач-анестезиолог-реаниматолог Усаченко С.В.

Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии № 1, кафедра биохимии
«КФУ им. В.И. Вернадского» Медицинская Академия им. С.И. Георгиевского

Актуальность: при любом оперативном вмешательстве, включая и пункцию заднего свода влагалища, существует риск развития геморрагических осложнений. Определение критериев, позволяющих выявить пациентов с большей вероятностью возникновения кровотечений, позволит снизить риск возникновения осложнений.

Цель исследования: определить риск кровопотери во время оперативного вмешательства от группы крови, резус-фактора и возраста человека.

Материалы и методы: исследование является аналитическим одномоментным, проведенным на базе клиники вспомогательных репродуктивных технологий. Группа крови и резус-фактор определялись цоликлональным методом. Для ультразвуковой визуализации кровопотери использовался аппарат «Ultrasonic scanner Honda HS-2000».

Результаты: анализ 300 случаев пункций заднего свода влагалища у пациентов находившихся в программе ЭКО, проведенных по 2018 г., показал, что кровопотеря во время оперативного вмешательства не зависит от группы крови и резус фактора, однако определилась взаимосвязь с возрастом пациента.

Выводы: у пациентов, входящих в группу возрастного риска геморрагических осложнений, при пункции заднего свода влагалища в программе ЭКО необходимо проводить профилактику избыточной кровопотери.

Литература

- Roh D., Martin A. «ABO Тип крови и расширение гематомы после внутримозгового кровоизлияния: исследовательский анализ» 2018 г.;
- Fucami T., Koga H. «Частота возникновения и факторы риска послеродового кровотечения при трансвагинальных родах в третичном перинатальном медицинском учреждении в Японии» 2019 г., World Health Organization рекомендации и классификация ИМТ.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Антонова Е.С., Храмова А.А., Смирнова М.Ю.

Научный руководитель: к.м.н., доцент Корнилова Т.Ю.

Кафедра акушерства и гинекологии

Ульяновский государственный университет

Актуальность: первые классификации факторов риска были предложены Е. Nickz и J. Goodwin и соавт. Единым выводом авторов всех классификаций факторов риска было

выделение группы женщин «высокого риска» с организацией за ними интенсивного наблюдения буквально с самого начала беременности.

Цель исследования: выявить факторы риска развития пренатальной патологии, которые повышают процент преждевременных родов и являются причинами репродуктивных потерь до 22 недели беременности.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 965 обменных карт, историй родов беременных, обратившихся в женскую консультацию ГУЗ ЦК МСЧ им. Заслуж. врача России Егорова В.А. в течение 2018 года.

Результаты: средний возраст беременных составил 26 лет. В возрасте менее 20 лет на учете состояло 15% беременных. Возрастная категория 30 лет и старше составила 25%. Было установлено, что почти у каждой четвертой (28%) брак был не зарегистрирован. Преобладали повторнородящие — 56%: на одну пациентку приходилось 2,3 беременности. В 7,5% случаев беременные признались, что давно курят. Среди экстрагенитальной патологии обращает на себя внимание высокая частота хронических инфекционных заболеваний в анамнезе: тонзиллит (20%), пиелонефрит (21%), гастрит (19%). Хронической артериальной гипертензией до беременности страдало 32% женщин. Женщины моложе 20 и старше 30 лет в 66% случаев завершили беременность срочными родами, у 12% — беременность замерла в первом триместре, у 22% случились преждевременные роды. Среди курящих женщин у 8% беременность замерла по типу гибели эмбриона на сроке 18–20 недель, у 51% беременность завершилась преждевременными родами.

Выводы: медико-социальные факторы риска развития пренатальной патологии: возраст беременной 30 лет и старше, неустroенность в семейной жизни, курение, наличие отягощенного акушерского анамнеза, хронических инфекционных заболеваний и артериальной гипертензии являются актуальными для жительниц города Ульяновска. Данные факторы повышают процент преждевременных родов и являются стойкими причинами репродуктивных потерь до 22 недели беременности.

Литература

1. Волков В.Г., Гранатович Н.Н. Основные причины материнской смертности в Тульской области в XXI в. // Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2017. Т. 16, № 2. С. 10–14.
2. Кукарская И.И., Ербактанова Т.А. Региональные аспекты мертворождаемости в Тюменской области в 2014 году // Медицинская наука и образование Урала. 2015. Т. 16, № 3 (83). С. 105–109.
3. Major risk factors for stillbirth in high-income countries: a systematic review and meta-analysis. Flenady et al. Lancet. 2011 Apr 16;377 (9774):1331–40.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРАЦЕПЦИИ У СТУДЕНТОК СПБГПМУ

Багрина Я.В., Пюрвеев С.С.

Научный руководитель: к.м.н. Воробцова И.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детского возраста

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Актуальность: обеспечение безопасного материнства и сохранения здоровья женщин это одна из основных задач современной медицины. Профилактика незапланированной беременности, снижение числа медицинских и криминальных абортс, материнской смертности после абортс — одни из путей решения данных задач.

Цель исследования: оценить методы и виды контрацепции, применяемые студентками СПбГПМУ

Материалы и методы: по специально разработанной методике в течении трех месяцев было проанкетировано 500 студенток СПбГПМУ.

Результаты: в ходе проведенного исследования было выяснено, что средний возраст опрошенных 21,33 лет. Большинство опрошенных составили студентки 3 курса (20,6%). На вопрос: