

ПОЛОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ПРЕДПОЧТЕНИЕ В ВЫБОРЕ КОНТРАЦЕПЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Королева А.Д., Фролов В.И.

Научный руководитель: к. м. н., ассистент Никогда Ю.В.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
Кубанский государственный медицинский университет

Актуальность: одной из важнейших составляющих репродуктивного потенциала страны является молодежь, половое поведение которой подвержено влиянию множества социальных и медицинских факторов.

Цель исследования: оценить имеющийся уровень знаний студентов о методах и способах контрацепции.

Материалы и методы: данные добровольного анонимного опроса.

Результаты: в опросе приняли участие 590 человек: 76% женского пола, 24% мужского.

Средний возраст участвовавших в исследовании студентов составил 21,8 лет. Наличие сексуального опыта имеется у 70,4% опрошенных. 12,2% опрошенных были заражены ЗППП. Столь высокий уровень не удивителен, так как всего лишь 58,2% используют барьерную контрацепцию, 10% не вступали в половой акт и 30% используют прерванный половой акт.

20% не знают верного способа защиты от ЗППП. Лишь 20% имеют понятие о девственной плеве. 6% считают, что нет вреда в применении экстренной контрацепции. 30% опрошенных считают, что 2 презерватива защищают лучше, чем 1.

Выводы: 1) высокий уровень ЗППП можно связать с низким уровнем знаний о методах контрацепции. 2) знания студентов КубГМУ значительно выше, чем в других вузах. По исходу анкетирования все пользуются резинками

Литература

1. Г.М. Савельева «Акушерство», 2000 г.;
2. Г.М. Савельева «Гинекология», 2012 г.;
3. Радзинский В.Е., Фукс А.М. «Акушерство»

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Курбанова Э.А., Нигаматова А.С.

Научный руководитель: ассистент Алиханова Е.С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Южно-Уральский государственный медицинский университет

Актуальность: встречаемость ХЭ колеблется от 2 до 73%. Разброс связан со сложностью диагностики. Морфологическое исследование позволяет дифференцировать ХЭ по степени активности, выбрать тактику лечения. Этот метод не используется Сито, первичная диагностика проводится на основании клинико-лабораторного обследования.

Цель исследования: определить клинико-морфологические особенности хронического активного эндометрита.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 51 истории болезни пациенток гинекологического отделения МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 с различными диагнозами («обострение хронического эндометрита», «апоплексия яичника», «острый аппендицит»), у которых установлен ХЭ по данным морфологического исследования эндометрия.

Результаты: средний возраст пациенток составил 33+8,4 года. Отягощенный соматический анамнез имели 60,8% (31) пациенток. В структуре соматической патологии преобладали за-