

ПОЛОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ПРЕДПОЧТЕНИЕ В ВЫБОРЕ КОНТРАЦЕПЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Королева А.Д., Фролов В.И.

Научный руководитель: к. м. н., ассистент Никогда Ю.В.
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии
Кубанский государственный медицинский университет

Актуальность: одной из важнейших составляющих репродуктивного потенциала страны является молодежь, половое поведение которой подвержено влиянию множества социальных и медицинских факторов.

Цель исследования: оценить имеющийся уровень знаний студентов о методах и способах контрацепции.

Материалы и методы: данные добровольного анонимного опроса.

Результаты: в опросе приняли участие 590 человек: 76% женского пола, 24% мужского.

Средний возраст участвовавших в исследовании студентов составил 21,8 лет. Наличие сексуального опыта имеется у 70,4% опрошенных. 12,2% опрошенных были заражены ЗППП. Столь высокий уровень не удивителен, так как всего лишь 58,2% используют барьерную контрацепцию, 10% не вступали в половой акт и 30% используют прерванный половой акт.

20% не знают верного способа защиты от ЗППП. Лишь 20% имеют понятие о девственной плеве. 6% считают, что нет вреда в применении экстренной контрацепции. 30% опрошенных считают, что 2 презерватива защищают лучше, чем 1.

Выводы: 1) высокий уровень ЗППП можно связать с низким уровнем знаний о методах контрацепции. 2) знания студентов КубГМУ значительно выше, чем в других вузах. По исходу анкетирования все пользуются резинками

Литература

1. Г.М. Савельева «Акушерство», 2000 г.;
2. Г.М. Савельева «Гинекология», 2012 г.;
3. Радзинский В.Е., Фукс А.М. «Акушерство»

ХРОНИЧЕСКИЙ ЭНДОМЕТРИТ. КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Курбанова Э.А., Нигаматова А.С.

Научный руководитель: ассистент Алиханова Е.С.
Кафедра акушерства и гинекологии
Южно-Уральский государственный медицинский университет

Актуальность: встречаемость ХЭ колеблется от 2 до 73%. Разброс связан со сложностью диагностики. Морфологическое исследование позволяет дифференцировать ХЭ по степени активности, выбрать тактику лечения. Этот метод не используется Сито, первичная диагностика проводится на основании клинико-лабораторного обследования.

Цель исследования: определить клинико-морфологические особенности хронического активного эндометрита.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 51 истории болезни пациенток гинекологического отделения МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 с различными диагнозами («обострение хронического эндометрита», «апоплексия яичника», «острый аппендицит»), у которых установлен ХЭ по данным морфологического исследования эндометрия.

Результаты: средний возраст пациенток составил 33+8,4 года. Отягощенный соматический анамнез имели 60,8% (31) пациенток. В структуре соматической патологии преобладали за-

болевания органов ЖКТ (21,6%) и мочевыделительной системы (19,6%). Заболевания органов репродуктивной системы в анамнезе присутствовали у всех женщин обследуемой группы. В 92,2% (47) случаев пациентки имели воспалительные заболевания органов малого таза ранее. Средний возраст коитархе — 17,6±1,7 лет, среднее количество половых партнеров — 3, барьерную контрацепцию использует только треть женщин. Основной жалобой на момент госпитализации был болевой синдром, гипертермию отмечали 66,7% (34) пациенток, НМЦ — 21,6% (11) обследуемых. Воспалительные изменения в ОАК присутствовало в 27,5% (14) случаев. Признаки эндометрита при УЗИ выявлены у 21,6% (11) женщин. Согласно заключению морфологического исследования эндометрия, низкая степень активности ХЭ диагностирована в 64,7% (33), умеренная — в 23,5% (12), высокая — в 11,8% (6) случаев.

Выводы: в большинстве случаев ХЭ диагностирован у женщин среднего репродуктивного возраста, имеющих отягощенный соматический и гинекологический анамнез, сексуально активных и не использующих барьерный метод контрацепции. Признаки воспаления по данным лабораторного обследования присутствовали у 27,5% пациенток. Признаки эндометрита при УЗИ выявлены у 21,6% женщин

Литература

1. Алимова, О.А. Клинико-морфологическая характеристика хронического эндометрита различной этиологии
2. Надвикова Т.В. «Клинико-иммунологические показатели в оценке активности воспалительного процесса в эндометрии у женщин с хроническим эндометритом».

АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О МЕТОДАХ КОНТРАЦЕПЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ ДО 18 ЛЕТ

Лысенко В.В.

Научные руководители: к. м. н. Пологойко Г.П., к. м. н. Тайц А.Н.

Кафедра акушерства и гинекологии

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Актуальность: несмотря на то что за последние годы количество несовершеннолетних матерей уменьшается, проблема раннего материнства не теряет своей актуальности. Только в Санкт-Петербурге за 2017 год родили 138 несовершеннолетних девушек. А по всей России 18 тыс.

Цель исследования: выяснить информированность женщин, родивших до 18 лет, о методах контрацепции, в сравнении с девушками, находящимися в данной возрастной группе, но не имеющих детей.

Материалы и методы: нами было опрошено 60 девушек в возрасте от 13 до 18 лет.

Основную группу составили 30 девушек, родившие до 18 лет. Контрольную группу 30 девушек до 18 лет, не имеющих детей. Нами была специально разработана анкета, включающая 20 вопросов. Сбор материала производился путем анкетирования девушек.

Результаты: девушки основной и контрольной групп недостаточно осведомлены о возможностях и методах контрацепции. Большинство респондентов, живущих половой жизнью, отдают предпочтение барьерным методам контрацепции. Несмотря на то что основным источником информации о контрацепции у большинства девушек основной группы является врач, большинство из них отрицательно относятся к гормональной контрацепции.

Выводы: необходимо проводить лекции о методах контрацепции, для повышения грамотности у подростков.

Литература

1. Руководство по контрацепции / Под ред. проф. В.Н. Прилепской, 2014 г.
2. «Основные показатели демографических процессов в Санкт-Петербурге в 2017 году» Статистический сборник / Петростат-СПб., 2018. 88 с.