

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОКСОКАРОЗА

Алмухамбедова А.Р., Салтереева С.Р.

Научный руководитель: к. м. н., доцент. Аракельян Р.С.
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии
Астраханский государственный медицинский университет

Актуальность исследования: токсокароз широко распространён среди животных. Основным резервуаром являются собаки. Их высокая численность, бесконтрольный выгул, низкий уровень дегельминтизации и отсутствие дезинвазии конcrementов приводят к контаминации яйцами *Toxocara canis* среды обитания человека и передачи данной инфекции [1].

Цели исследования: рассмотреть клинико-эпидемиологические аспекты токсокароза в Астраханской области в 2013–2017 гг.

Материалы и методы: отчетные формы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», электронная база данных по заболеваемости паразитарными болезнями в АО. Было проанализировано 34 эпидемиологических карт лиц, инвазированных токсокарами.

Результаты: в Астраханской области в 2013–2017 гг. в структуре паразитарных болезней токсокароз составил 0,22% случаев [2]. Инвазия регистрировалась чаще у лиц трудоспособного возраста. Клиническая картина малоспецифична, у 37% больных жалобы отсутствовали, легочные поражения наблюдались в 24%, абдоминальные боли и интоксикация по 11%, поражения суставов в 6%. Диагноз «токсокароз» был выставлен на основании ежегодно проводимых профилактических медицинских осмотров в 91% случаев, в одном случае паразит был выявлен у пациента контактного по члену семьи. Факторами риска заболевания являются не соблюдение правил личной гигиены, употребление в пищу немытых фруктов и овощей, тесный контакт с собаками, кошками, онихофагия, геофагия.

Выводы: токсокароз является актуальной проблемой современного общества, несмотря на малоспецифические симптомы заболевания, большинство случаев было выявлено на медицинских профилактических осмотрах, что обосновывает значимость последних.

Литература

1. Аракельян Р.С., Галимзянов Х.М., Карпенко С.Ф., Бедлинская Н.Р., Мирекина Е.В., Шендо Г.Л., Курбангалиева А.Р. Паразитарная заболеваемость населения астраханской области за 2013–2015 гг. В сборнике: Актуальные вопросы диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний на юге России Материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. 2016. С. 20–22.
2. Донскова А.Ю., Кондрашова В.О., Аракельян Р.С. Токсокароз человека в астраханской области. Молодежный инновационный вестник. 2016. Т. 5. № 1. С. 234.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АСТРАХАНСКОЙ РИККЕТСИОЗНОЙ ЛИХОРАДКИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Анкулова С.К.

Научный руководитель: к. м. н., ассистент Бедлинская Н.Р.
Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии
Астраханский государственный медицинский университет

Актуальность исследования: известно, что территория Астраханской области (АО) является эндемичной для разных видов лихорадок [2, 3], включая Астраханскую риккетсиозную лихорадку (АРЛ) [1]. В последние годы в АО создалась напряженная эпидемиологическая ситуация по АРЛ.