

ного и миелоидного кроветворения стромы портальных трактов. При восходящем пути инфицирования парвовирусом B19V+ аналогичная по клеточному составу инфильтрация максимально была выражена в строме легочной ткани и слизистых оболочках тонкой и толстой кишки, подтвержденная положительной экспрессии вируса B19V+. В печени слабая клеточная инфильтрация определялась в синусоидах со слабо выраженной положительной экспрессии вируса B19V+. Патологической незрелости в паренхиматозных органах не отмечено.

Выводы: отечная форма ГБН проявляется патологической незрелостью печеночной ткани с диффузным экстрамедуллярным кроветворением в синусоидах и портальных трактах. При парвовирусной инфекции поражение органов зависит от пути инфицирования. Парвовирус B19V+ может быть обнаружен в клетках пораженных органов ИГХ-методом [2].

Литература

1. Okeke T.C., Egbugara M.N., Ezenyeaku C.C., Ikeako L.C. Non- immune hydrops fetalis. Niger J Med 2013; 22: 4: 266–273.
2. Young, N.S., Brown, K.E., 2004. Parvovirus B19. N. Engl. J. Med. 350, 586–597. <https://doi.org/10.1056/NEJMra030840>.

СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ

РОЛЬ СМЕХОТЕРАПИИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ В ЛПУ

Багданова М.В., Уваров Н.А., Уварова Д.Б.

Научный руководитель: к. м. н., доцент Поздняк В.В.

Кафедра психиатрии и наркологии

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Актуальность исследования: при нахождении в стационаре врачу необходимо создать комплаенс с пациентом, условием этого являются знания в области общения с больными и умение найти путь к созданию нужного контакта с ними [1]. Больничная клоунада, как метод смехотерапии может решить эту задачу.

Цель исследования: изучение влияния смехотерапии на эмоциональное состояние пациентов, участвующих в исследовании. Популяризация представлений о больничной клоунаде.

Материалы и методы: в исследовании приняло участие 33 пациента травматолого-ортопедического и педиатрического отделения ДГБ № 22, средний возраст =8 лет. Для оценки эмоционального состояния пациенты проходили восьмицветовой тест Люшера до и после сеанса смехотерапии, который проводила команда больничных клоунов.

Результаты: после 25 минутного сеанса смехотерапии у 15 детей после снизилась тревожность, осталась на том же уровне у 2, повысилась у 16 (из которых 10 эмоционально возбуждены, 6 испытывают возбуждающий интерес). До сеанса 16 детей испытывали стресс, 6 состояние дезадаптации, 14 разочарование, после сеанса эти состояния не диагностировались. До сеанса 33 ребенка испытывали чувства одиночества и потребность в дружеских отношениях, после только у 6 детей остались схожее состояние.

Выводы: смехотерапия как фактор социально-психологической реабилитации детей в ЛПУ является эффективным методом для коррекции эмоционального состояния пациентов: уменьшения стресса, дезадаптации, эмоционального напряжения, снижение чувства одиночества.

Литература

1. Поздняк В.В. Медицинская психология в курсе психиатрии /Поздняк В.В., Гречаный С.В., Ильичев А.Б. // СПб., 2018. Сер. Библиотека педиатрического университета стр.78.