

Выводы: 1) у 58% беременных, находящихся в отделении патологии беременности, на момент исследования, были выявлены депрессивные симптомы различной степени. 2) Характерный паттерн среди исследуемых- субдепрессия в сочетании с умеренным уровнем РТ и ЛТ. 3) Наиболее часто у беременных с депрессивными симптомами различной степени выявлялась экстрагенитальная патология и угроза прерывания беременности. 4) Для уточнения выраженности тревожно-депрессивных расстройств необходима консультация психиатра или психотерапевта. [2] Следует принять во внимание полученные результаты при разработке индивидуальной модели психотерапии.

Литература

1. Перова Е.И., Стеняева Н.Н., Аполихина И.А., Беременность на фоне тревожно-депрессивных расстройств, 2013.
2. Пушкарева Т.Н. Клинико-психопатологические характеристики тревожных и депрессивных расстройств у беременных женщин с перинатальными потерями в анамнезе / Т.Н. Пушкарева // Архив психиатрии. Т. 10, № 2. 2009.

КОРРЕЛЯЦИЯ НЕТОГОЛИЗМА И ИГРОВОЙ АДДИКЦИИ, ПСИХОСОМАТИКОЙ У ДЕТЕЙ С УРОВНЕМ ТРЕВОГИ ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ТИПОМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО ОТДЕЛЬНЫМИ АСПЕКТАМИ СЕМЕЙНЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ

Кокурenkova П.А., Исаева Т.К., Панкратова П.А.

Научный руководитель: к. м. н., доцент Шишков В.В.

Кафедра психиатрии и наркологии

Консультативно-диагностический центр СПбГПМУ

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Актуальность исследования: сейчас невозможно представить нашу жизнь без ПК. Однако, только недавно люди столкнулись с последствиями всех «благ» виртуального мира [1, 3]. Особенно этот вопрос актуален для подрастающего поколения [2]. Другими современными детей являются гаджеты. Какими же они будут, наши дети?

Цель исследования: определить распространенность нетоголизма, игровой зависимости и выявить связаны ли они с психосоматикой, типом семейного воспитания, уровнем личностной и реактивной тревоги родителей;

Материалы и методы: дети в возрасте от 5,5–14 лет и их родители; Опросник АСВ. Э.Г. Эйдемиллера; Опросник Спилберга-Ханина Опросник Котлярова для выявления зависимости от компьютерных игр; Опросник Кулакова для определения Интернет-аддикции; Гиссеновский опросник психосоматических жалоб;

Результаты: не было обнаружено нетоголиков, в то время как зависимыми от компьютерных игр оказались 33%. У 15% опрошенных выявилось серьезное влияние Интернета Среди родителей, чьи дети увлекаются компьютерными играми, выявлены гипопротекция 9% против 0% в контрольной группе; игнорирование потребностей ребенка 9% против 0%, проекция на ребенка собственных нежелательных качеств 18 и 4% в контрольной группе. У 27% в обеих группах не было выявлено патологических типов взаимоотношений в семье. В контрольной группе преобладают такие аспекты воспитания как гиперпроекция, предпочтение женских качеств и чрезмерные требования. В основной группе данных типов воспитания практически не наблюдается. У 75% родителей, чьи дети являются аддиктами компьютерных игр повышен уровень личностной тревоги (тревожности), в контрольной группе данный показатель равен 66%. По результатам гиссеновского опросника не было выявлено значительных отличий.

Выводы: таким образом, можно говорить о том, что треть всех опрошенных являются игроманами, четверть подвержена серьезному влиянию Интернета. На развитие компьютерной зависимости оказывает влияние гипопротекция, что можно трактовать как нежелание роди-

теля принимать участие в жизни ребенка. Остальные, исследуемые нами факторы, очевидно, не так значимы в развитие компьютерной зависимости. Следовательно, по результатам нашего исследования, данную патологию можно считать полиэтиологичной. Очевидно, на ее развитие влияют иные факторы, не изученные нами.

Литература

1. Егоров А.Ю. современные представления об Интернет-аддикциях и подходах к их коррекции // Медицинская психология в России. 2015. Т. 4, N 33;
2. Пережогин Л.О., Вострокнутов Н.В. Нехимическая зависимость в детской психиатрической практике // Российский психиатрический журнал. 2009. N 4. С. 86–91;
3. Young K.S. The first treatment model to address Internet addiction // Journal of Cognitive Therapy 2011. Vol. 25, N.4. P. 304–312.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Кольцова Е.А., Долженкова Н.А.

Научные руководители: д. м. н., профессор Злоказова М.В., к. м. н., Семакина Н.В.
Кафедра психиатрии им. профессора В.И. Багаева
Кировский государственный медицинский университет

Актуальность исследования: актуальной проблемой является распространение информации и провоцирование девиантного поведения (ДП) среди молодежи в Интернет-контенте (ИК) [1, 2]. Этому посвящено наше исследование.

Цель исследования: изучить влияние Интернет-контента на психическое здоровье подростков, определить Интернет-маркеры (ИМ) девиантного поведения, для дальнейшего создания программы контроля за аккаунтами.

Материалы и методы: обследовано 83 учащихся 10 классов общеобразовательной школы г. Кирова. Использовались методы: психодиагностический (авторская анкета для выявления влияния Интернета на психическую и физическую сферы подростков), автоматизированного программирования, статистический.

Результаты: было выявлено наличие косвенных признаков Интернет-зависимости у 51% подростка: появление после длительного пребывания в онлайн подавленного настроения — 42,6%, тревоги — 25,9%, озлобленности — 22,2%, неприятных болевых ощущений в спине и руках — 63,6%, усталости — 39,0%, бессонницы — 37,0%. Информация из Интернета о насилии вызывала панику у 71,1%. Подвергались оскорблениям в онлайн — 68,8% и сами использовали вербальную агрессию к собеседникам — 46,3%. После онлайн у 8,3% подростков постоянно присутствовали суицидальные мысли, заходили на сайты «групп смерти» — 2,0%. На основании полученной информации создана программа позволяющая, контролировать аккаунты подростков, при помощи которой в дальнейшем планируется соотнести психическое состояние подростков с ИМ девиантного поведения в интернете (элементы девиантных субкультур, содержащиеся в «хештегах», изображения, рекламе, публичных высказываниях в соцсетях и др.).

Выводы: выявление Интернет-маркеров и создание программы контроля Интернет-аккаунтов необходимо для превенции психосоциальной дезадаптации подростков.

Литература

1. Щебетко С.А. Установки на черты личности как предиктор активности «друзей» пользователя социальной сети «В контакте» // Национальный психологический журнал. 2016. № 4 (24). С. 34–43.
2. Антонова Ю.А. Виртуальное сообщество в социальной сети как способ распространения экстремисткой идеологии среди молодежи // Политическая лингвистика. 2012. № 4 (24). С. 71–80.