

теля принимать участие в жизни ребенка. Остальные, исследуемые нами факторы, очевидно, не так значимы в развитие компьютерной зависимости. Следовательно, по результатам нашего исследования, данную патологию можно считать полиэтиологичной. Очевидно, на ее развитие влияют иные факторы, не изученные нами.

Литература

1. Егоров А.Ю. современные представления об Интернет-аддикциях и подходах к их коррекции // Медицинская психология в России. 2015. Т. 4, N 33;
2. Пережогин Л.О., Вострокнутов Н.В. Нехимическая зависимость в детской психиатрической практике // Российский психиатрический журнал. 2009. N 4. С. 86–91;
3. Young K.S. The first treatment model to address Internet addiction // Journal of Cognitive Therapy 2011. Vol. 25, N.4. P. 304–312.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В ИНТЕРНЕТЕ

Кольцова Е.А., Долженкова Н.А.

Научные руководители: д. м. н., профессор Злоказова М.В., к. м. н., Семакина Н.В.
Кафедра психиатрии им. профессора В.И. Багаева
Кировский государственный медицинский университет

Актуальность исследования: актуальной проблемой является распространение информации и провоцирование девиантного поведения (ДП) среди молодежи в Интернет-контенте (ИК) [1, 2]. Этому посвящено наше исследование.

Цель исследования: изучить влияние Интернет-контента на психическое здоровье подростков, определить Интернет-маркеры (ИМ) девиантного поведения, для дальнейшего создания программы контроля за аккаунтами.

Материалы и методы: обследовано 83 учащихся 10 классов общеобразовательной школы г. Кирова. Использовались методы: психодиагностический (авторская анкета для выявления влияния Интернета на психическую и физическую сферы подростков), автоматизированного программирования, статистический.

Результаты: было выявлено наличие косвенных признаков Интернет-зависимости у 51% подростка: появление после длительного пребывания в онлайн подавленного настроения — 42,6%, тревоги — 25,9%, озлобленности — 22,2%, неприятных болевых ощущений в спине и руках — 63,6%, усталости — 39,0%, бессонницы — 37,0%. Информация из Интернета о насилии вызывала панику у 71,1%. Подвергались оскорблениям в онлайн — 68,8% и сами использовали вербальную агрессию к собеседникам — 46,3%. После онлайн у 8,3% подростков постоянно присутствовали суицидальные мысли, заходили на сайты «групп смерти» — 2,0%. На основании полученной информации создана программа позволяющая, контролировать аккаунты подростков, при помощи которой в дальнейшем планируется соотнести психическое состояние подростков с ИМ девиантного поведения в интернете (элементы девиантных субкультур, содержащиеся в «хештегах», изображения, рекламе, публичных высказываниях в соцсетях и др.).

Выводы: выявление Интернет-маркеров и создание программы контроля Интернет-аккаунтов необходимо для превенции психосоциальной дезадаптации подростков.

Литература

1. Щебетко С.А. Установки на черты личности как предиктор активности «друзей» пользователя социальной сети «В контакте» // Национальный психологический журнал. 2016. № 4 (24). С. 34–43.
2. Антонова Ю.А. Виртуальное сообщество в социальной сети как способ распространения экстремисткой идеологии среди молодежи // Политическая лингвистика. 2012. № 4 (24). С. 71–80.