

СФОРМИРОВАННОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ У СТУДЕНТОВ

Меликян О.А.

Научный руководитель: к. м. н., доцент Ильичев А.Б.

Кафедра психиатрии и наркологии

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Актуальность исследования: согласно Л.С. Выготскому (1960), высшие психические функции формируются путем превращения внешней речи во внутреннюю. При психопатологическом диатезе обнаружена неполная сформированность внутренней речи [1], с предрасположенностью к диалогическому расщеплению «я» [2, 3].

Цель исследования: изучение развития внутренней речи у здоровых.

Материалы и методы: 284 студента медицинского ВУЗа и 150 студентов технического колледжа. Критерии отбора: родной русский язык и отсутствие данных за психическое расстройство. Предлагался опросник о развернутости, озвученности, диалогичности и деавтоматизации мышления.

Результаты: неполная интериоризация обнаружена у 97,89% студентов ВУЗа и 97,32% студентов колледжа. У 89,08% студентов ВУЗа во внутренней речи сохранилась развернутость, у 85,21% — озвученность, у 50,7% — диалогичность. Среди студентов колледжа — у 89,29%, 87,5% и 57,14% соответственно. При этом в детстве их внутренняя речь была более сформированной: наличие указанных явлений в детстве отметили 77,82% студентов ВУЗа и 79,46% студентов колледжа.

Выводы: у современных психически здоровых людей часто встречается неполная интериоризация — с сохранением развернутости, озвученности и диалогичности внутренней речи. Это может быть связано с современными особенностями получения и усвоения информации (наглядно-образный способ обучения, опосредованность общения электронными устройствами).

Литература

1. Ильичев А.Б., Давтян Е.Н. Некоторые особенности мышления и речи у детей и подростков как проявление психопатологического диатеза // Педиатр. 2017. Т. 8. № S1. С. 138–139.
2. Давтян Е.Н., Ильичев А.Б., Давтян С.Э. Симптом диалогического расщепления «я» как начальный этап нарушения внутренней речи при шизофрении // Психиатрия и психофармакотерапия. 2017. Т. 19. № 6. С. 62–70.
3. Ильичев А.Б., Давтян Е.Н. Психопатология диалогического расщепления: сравнительный анализ // Прикладные информационные аспекты медицины. 2018. Т. 21. № 2. С. 37–44.

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ У ЖЕНЩИН ПРИ ДЕПРЕССИИ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Морозова Ю.В., Булыгина А.А.

Научный руководитель: к. м. н., доцент Кошавцев А.Г.

Кафедра психиатрии и наркологии

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Актуальность исследования: большинство женщин не имеют нарушений настроения во время менопаузы, но примерно у 20% из них — депрессии. Исследования настроения выявляли повышенный риск депрессии во время перименопаузы с его снижением в постменопаузальные годы. Итак, наличие менопаузы с депрессией может отражаться на ЭЭГ.

Цель исследования: выявить зависимость фона настроения и функционального состояния мозга (по данным ЭЭГ) от наличия менструальной функции.