

Цель исследования: оценить уровень когнитивного функционирования (аналитико-синтетическая способность, внимание, память) у пациентов, длительно принимающих нейрореплептики.

Материалы и методы: 1) 8 пациенток психиатрической больницы им. Скворцова-Степанова, непрерывно и длительно принимающие нейрореплептики и не имеющие сопутствующих заболеваний ГМ и соматических патологий. 2) Опрос (сбор анамнеза). 3) Оценка по шкале PANSS. 4) Когнитивные тесты.

Результаты: 1) Методика Мюнстерберга: от 4 до 15 слов (среднее 10,75), 1 ошибка; 2) Методика «10 слов»: от 3 до 7 слов (среднее 5,375); 3) Методика «Классификация понятий»: 75% испытуемых справились с заданием. 4) Шкала PANSS: Дезорганизация мышления: 37,5%, тревожность: 87,5%, Бред: 12,5%, социальная изоляция: 75%, галлюцинации: 50%, из них 75% звуковые, соматизация: 25%, депрессия: 37,5%, 62,5% ровное настроение, самооценка: 25% заниженная, 12,5% завышенная, нарушения абстрактного мышления: 25%, нарушения суждений и критики: 25% дезориентированы во времени.

Выводы: антипсихотики в большинстве случаев не приводят к существенному снижению таких когнитивных функций, как внимание, память и аналитико-синтетическая способность. При этом они стабилизируют настроение пациентов и влияют на бредообразование.

Литература

1. Руководство по психиатрии: В 2-х т. Т. 2 / А.С.Тиганов. Р 84 А.В. Снежневский, Д.Д. Орловская и др, Под ред. А.С. Тиганова. М.: Медицина, 1999.
2. <http://www.modo-novum.ru/pslekarstva/neiroleptik.htm>.

КОРРЕЛЯЦИЯ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ, УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ТРЕВОЖНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ С АДАПТАЦИОННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ РЕБЕНКА

Соловьева А.А., Кокурenkova П.А.

Научный руководитель: к. м. н., доцент В.В. Шишков

Кафедра психиатрии и наркологии

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Актуальность исследования: адаптационные способности человека, сформированные в детстве, являются базой для формирования здоровой личности, а их недостаток почвой для психопатологии [1, 2]. Поэтому очень важно еще в детстве выявить адаптационную модель ребенка [3].

Цель исследования: проанализировать влияние стиля воспитания и тревожности родителей на адаптационные способности ребенка и формирование психопатологии.

Материалы и методы: тестирование родителей: «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис (АСВ), Тест Спилбергера — Ханина. Тестирование детей: Проективный тест «Человек под дождем», проективный тест «Несуществующее животное».

Результаты: прослеживается корреляция между повышенной тревожностью и тревогой родителей, гиперпротекцией и предпочтением женских качеств в воспитании, с одной стороны, и нежеланием преодолевать жизненные трудности у детей, с другой стороны. При отсутствии патологического типа воспитания не выявляется недостаточность адаптации.

Выводы: при анализе тестирования детей и родителей была выявлена взаимосвязь между стилем воспитания, степенью тревожности родителей и адаптационной способностью и страхами детей, что свидетельствует о необходимости коррекции методов воспитания с целью повышения психологической готовности детей к жизненным трудностям.

Литература

1. Нахимовский А.И., Шишков В.В. Практическая психотерапия детей и подростков.
2. Шишков В.В. Психотерапия функциональных расстройств. Карманный справочник врача и психолога.
3. Эйдемиллер Э.Г. Семейная психотерапия.