

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ВПЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ГЕНИТАЛИЙ

Гриб П. В.

Научный руководитель: к.м.н., доцент Петунова Янина Георгиевна
Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии
Санкт-Петербургский Государственный Университет

Контактная информация: Гриб Полина Васильевна — студентка 5 курса медицинского факультета СПбГУ.
E-mail: polinkagrib1997@gmail.com

Ключевые слова: аногенитальные бородавки, ВПЧ, ИППП

Актуальность: ВПЧ рассматривается как один из основных факторов развития рака гениталий. В литературе описаны предположения о возможной корреляции между ИППП и более высоким риском развития ВПЧ-ассоциированного онкологического процесса.

Цель исследования: проанализировать социально-демографические, эпидемиологические и поведенческие показатели среди пациентов с диагнозом аногенитальные бородавки.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 116 медицинских карт амбулаторного больного (форма 025/у) консультативно-диагностического отделения СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» за период с 2017 по 2019 гг. Оценивали социально-демографические показатели (возраст и пол), поведенческие показатели (возраст первого полового контакта и наличие постоянного партнера) в соответствии с Методическими рекомендациями «Анализ эпидемиологической системы по ВИЧ-инфекции и сопутствующим заболеваниям (туберкулез, ИППП, гепатиты)» (утв. Минздравсоцразвития РФ 20.09.2007 № 6964-РХ).

Результаты: пациенты с диагнозом аногенитальные бородавки были разделены на две группы. Основную группу составили 40 пациентов, у которых по результатам ПЦР обнаружены сопутствующие ИППП (2017-19 человек, из них 18 женщин; 2018 — 10 человек, — женщин 7; 2019 — 11 человек, 2 женщины), а остальные 76 пациентов были объединены в группу сравнения (2017-18 человек, из них 13 женщин; 2018 — 18 человек, — 15 женщин; 2019 — 40 человек, все мужчины). В основной группе преобладал женский пол (67,5%), а в группе сравнения мужской пол (63,1%). Средний возраст пациентов в основных группах составил 26,7+8,9 (ME22) лет. В группах сравнения средний возраст пациентов составил 32,2+14 (ME28) лет. В основной группе (ВПЧ и ИППП) прослеживается тенденция к более раннему началу половой жизни (16,45+1,8 (ME 16,5)). А также в группе ВПЧ и ИППП чаще других выявлялась уреоплазменная инфекция (72,5%). На втором месте по частоте выявляемости была микоплазменная инфекция (20%) и на третьем месте хламидийная инфекция (17,5%).

Выводы: по результатам исследования удалось установить, что пациенты с ВПЧ в 34,4% случаев страдают другими ИППП, что требует обязательного расширенного обследования при обращении. Пациенты с ВПЧ в сочетании с другими ИППП (обращающиеся к венерологу) чаще женщины (67,5%) в возрасте 27–28 лет, начавшие половую жизнь примерно в 16–17 лет.

Литература

1. Инфекции, передаваемые половым путем: руководство для врачей/ Е.В. Соколовский [и др.]. — М.: Медпресс-Информ, 2006. — 231 с.
2. Ляпина Л.В., Касаткин Е.В., Стебелько О.Ю. Папилломавирусная инфекция и рак (этиология, эпидемиология, вакцинопрофилактика): учебное пособие. — СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2013. — 88.
3. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных аногенитальными (венерическими) бородавками/ раб. группа: Ю.Н. Перламутров [и др.]. — Москва, 2013. — 12 с.