

ДЕРМАТОСКОПИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПИГМЕНТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА КОЖЕ У ЛИЦ ДЕТСКОГО И ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Степаненкова Л. В., Шведова А. А.

Научный руководитель: к.м.н., доцент Смыкова Анастасия Николаевна
Кафедра дерматовенерологии имени профессора В.И.Прохоренкова с курсом косметологии и ПОФГБОУ ВО
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения РФ

Контактная информация: Степаненкова Людмила Вячеславовна — студентка 6 курса Лечебного факультета.
E-mail: Stepanenkova_lv@mail.ru

Ключевые слова: дерматоскопия, невус

Актуальность: в практике дерматолога ежедневно встречаются пациенты с различными новообразованиями на коже. Не всегда на приеме удастся точно отифференцировать вид конкретного образования. Как показали результаты многих исследователей и, в частности, сотрудников Программы меланомы ВОЗ, более 50% меланомы развивается на месте предшествующих врожденных или приобретенных невусов. Дерматоскопия — современный метод дифференциальной диагностики различных образований на коже.

Цель исследования: изучить структурные особенности невусов у лиц обоего пола в разных возрастных группах (1 группа — 3–14 лет; 2 группа — 58–76 лет).

Материалы и методы: в процессе выполнения исследования были использованы теоретические (анализ научно-методической литературы по теме исследования), эмпирические (метод математической статистики) методы исследования, дерматоскопия с определением дерматоскопической модели и расчётом дерматоскопического индекса по ABCD. Исследование проводилось дерматоскопом модели HeineDelta20. Объектом исследования стали дети (3–14 лет) и пожилые люди (58–76 лет), на теле которых были обнаружены невусы.

Результаты: в возрастной группе 3–14 лет в 93,6% случаев невусы имели глобулярную, а в 6,4% — ретикулярную дерматоскопическую модель. Среднее значение дерматоскопического индекса (ДИ) составило 2,7 (от 1,4 до 3,3), что свидетельствует о доброкачественности невусов (до 4,75). В возрастной группе 58–76 лет в 88,2% случаев невусы имели гомогенную, а в 11,8% — ретикулярную дерматоскопическую модель. Среднее значение ДИ составило 3,9 (от 2,8 до 4,4), что также свидетельствует о доброкачественности невусов.

Выводы: основной дерматоскопической моделью невусов в возрастной группе 3–14 лет является — глобулярная (ретикулярная в 14 раз реже), а в возрастной группе 58–76 лет — гомогенная (ретикулярная в 7 раз реже). Все невусы носили доброкачественный характер.

Литература

1. Саламова И.В., Мордовцева В.В. — Проблемы диагностики диспластических меланоцитарных невусов / Российский журнал кожных и венерических болезней // 2016; 19(1)
2. Панкратов В.Г., Ревотюк А.А. — Дерматоскопия пигментных образований кожи — неинвазивный тест для дифференциальной диагностики меланомы кожи / Медицинские новости № 4. 2011