

СООТНОШЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ОСОБЕННОСТЕЙ АНОЗОГНОЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИМУЛЯТОРОВ (В ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ)

Грановская Е. А.

Научный руководитель: к.пс.н., доцент Бочаров В.В.

Кафедра клинической психологии

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет

Контактная информация: Грановская Елизавета Александровна — студентка 6 курса, факультет клинической психологии. E-mail: rsneko37@gmail.com

Ключевые слова: анозогнозия, синдром зависимости, реабилитация.

Актуальность исследования: анозогнозия у наркологических больных с синдромом зависимости от стимуляторов недостаточно изучена. Пациенты, находящиеся в зависимости от синтетических катионов, не часто попадают в стационар и учитываются, так как множество «синтетических наркотиков» еще не запрещены на законодательном уровне. Важно понимание психологических характеристик пациентов и выраженности у них анозогнозии для построения эффективных программ реабилитации.

Цель исследования: изучить особенности проявления анозогнозии у пациентов с синдромом зависимости от стимуляторов.

Материалы и методы: опросник анозогнозии при наркотической зависимости (Ю.В. Рыбакова, Р.Д. Илюк, Е.М. Крупицкий, В.В. Бочаров); Критерии выраженности наркотической анозогнозии для врачей экспертов (Рыбакова Ю. В.); Визуальная аналоговая шкала атрибуции наркомании (Ю.В. Рыбакова); Визуальная аналоговая шкала патологического влечения к наркотику (Ю.В. Рыбакова); ЦТО (Е.Ф.Бажин, А.М.Эткинд 1983); Шкала готовности к изменению и стремления к лечению (адаптация В.М.Ялтонского 2010); Личностный дифференциал Фактор-О (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.); Фрайбургский опросник психопатизации личности (А.А. Крылов, Т.И. Ронгинский).

Результаты: для пациентов с синдромом зависимости от стимуляторов характерно частичное признание собственного заболевания, проявляющееся в понимании симптомов болезни и формальном принятии статуса наркозависимого, сочетающемся с отсутствием реального осознания и личностного принятия существующих проблем. Отсутствие готовности вести трезвый образ жизни связано с недостаточной осознанностью последствий заболевания. Низкий уровень патологического влечения к ПАВ отражает установочное поведение, связанное с групповыми нормами терапевтического сообщества. Эмоциональное отношение пациентов к употреблению ПАВ характеризуется его неосознанным отвержением, выявляется оптимистический настрой к собственной личности и лечению. Обнаруживается низкий уровень осознания проблем, с другой стороны выявляется неосознанное отвержение заболевания и надежда на изменение, что отражает отсутствие реального осознания существующих проблем, желание «исцеления» сочетается с непониманием механизмов заболевания и стратегий борьбы с ним. Для пациентов характерно протекание психической деятельности по мужскому типу, не склонны к рефлексии, свойственно стремление к доверительно-откровенному взаимодействию, выражена экстравертированность, высокий уровень тревожности и возбудимости в сочетании с быстрой истощаемостью.

Выводы: в ходе формирования критериев отнесения к группе риска в связи с показателями шкал анозогнозии у пациентов с синдромом зависимости от стимуляторов были выделены следующие: 1. Осознание себя носителями положительных характеристик личности. 2. Неготовность вести трезвый образ жизни. 3. Признание проблем с употреблением ПАВ и желание измениться. 4. Прохождение реабилитационного лечения неоднократно количество раз. 5. Возраст: чем выше возраст, тем выше критерий риска.

Литература

1. Анцыборов А. В., Мрыхин В. В. Синтетические катионы «соли для ванн»: механизм действия, токсикологические аспекты, клиника, формирование зависимости // Интерактивная наука. 2017.
2. Минздрав России от 27.12.2013 N 13-2/10/2-9886 <О представлении органами исполнительной власти субъектов РФ ежегодного доклада о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по итогам деятельности за отчетный год в Правительство РФ.
3. Минздрав России от 31.10.2020. <Министр Михаил Мурашко: в России наблюдается снижение заболеваемости наркоманией.