

# ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «НЕПАРНАЯ ВЕНА» В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИЙ АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ С ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ ДО РЕНЕССАНСА

Илюшкина А. С.

Научный руководитель: к. культурологии, доцент Ланцева А.М.  
Кафедра латинского языка и основ терминологии педиатрического факультета  
ФГАОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

**Контактная информация:** Илюшкина Алёна Сергеевна — студентка 2 курса, педиатрический факультет.  
E-mail: alenailushkina92@gmail.com

**Ключевые слова:** “vena azygos”, непарная вена, трактат.

**Актуальность исследования:** знание истории развития и создания медицинской терминологии значительно расширяет кругозор студентов; упрощается усвоение и осмысление терминов, намного легче воспринимаются те процессы, которые стоят за ними. Это, в свою очередь, приводит к более глубокому пониманию диагностического смысла слов, развитию клинического мышления, которое так необходимо во врачебной практике.

**Цель исследования:** рассмотреть происхождение термина «vena azygos» (непарная вена) и проследить его развитие с эпохи античности вплоть до Ренессанса.

**Материалы и методы:** были изучены анатомические трактаты Гиппократов, Галена, Аристотеля и Везалия в переводе на современные европейские языки. В работе были применены как общенаучные методы анализа и синтеза, так и текстологический, компаративный, исторический, сравнительно-исторический методы, а также междисциплинарная методология на стыке анатомии, клинических и гуманитарных дисциплин.

**Результаты:** В своей работе Гиппократ утверждает, что «верхняя полая вена» (vena cava superior) направляется вверх, раздваиваясь на яремную (vena jugularis) и подключичную вены (vena subclavicularis). Отсюда следует, что во времена Гиппократов о существовании непарной вены (vena azygos) известно не было. Аристотель в своём великом трактате «Περὶ τὰ ζῴα ἱστορίαι» («Об истории животных») впервые описывает ход вены, который очень похож на таковой у непарной вены. Гален в работе «Книга диеты Гиппократов острых болезней и дневник (комментарий) Галена» («Hippocrates De acutorum morborum victu liber et Galeni commentarius») впервые использовал термин (αζύγος φλέβα), однако, не как официальный анатомический термин, а скорее как прилагательное к термину «вена», описывая отсутствие подобной парной вены на левой стороне [1, с. 529]. Везалий в своём трактате «Epistola docens venam axillarem dextri cubiti in dolore laterali secandam» («Венесекционное письмо») описал ход азигосной вены в соответствии с современными ему анатомическими учебниками, дал конкретные заключения относительно позвоночного уровня, а также происхождения термина «azygos» («...она заслуживала того, чтобы её так называли, поскольку ни одна соответствующая ей жилка не имела шансов существовать на противоположной стороне...») [2].

**Выводы:** в ходе работы мы пытались определить происхождение термина «vena azygos» и пришли к выводу, что именно Гален, выдающийся врач и анатом, впервые использовал термин «непарная» («azygos») в словосочетании с понятием «вена». В соответствии с анатомическими построениями Галена, непарная вена — это вена, лежащая на правой стороне позвоночного столба в области грудной клетки. Намного позже Андреас Везалий, основоположник научной анатомии, взял данное прилагательное в качестве официального термина — «vena azygos» — «непарная вена». Это понятие сохранилось до наших дней и повсеместно используется, являясь международно признанным анатомическим термином [3].

## Литература

1. Galenus C. Hippocratis de acutorum morborum victu liber et Galeni commentaries II // Opera Omnia / Carolus Gottlob Kühn (ed.). — Vol. XV. — D. Carolus Gottlob Kühn, Lipsiae Leipzig, 1821. — P. 529.
2. Vesalius A. Epitome of Andreas Vesalius / L.R. Lind, C.W. Asling (ed.). — Cambridge, Massachusetts, and London: MIT Press, 1949. — Vol.21. — 103 p.
3. Netter F.H. Atlas of Human Anatomy. — 7th ed. — Philadelphia: Elsevier Saunders, 2015. — 672 p.