

ОТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН К ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ В ВОПРОСАХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Ефремова У. С.

Научный руководитель: к.м.н. доцент Киньябулатов А.У.
Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО
Башкирский государственный медицинский университет

Контактная информация: Ефремова Ульяна Сергеевна — студентка 2 курса лечебного дела.
E-mail: gloska01@mail.ru

Ключевые слова: ВИЧ, отношение к ВИЧ-инфицированным, знания о ВИЧ.

Актуальность: по данным Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) [1], в последние года увеличивается количество ВИЧ-инфекцией женщин. У населения к носителям ВИЧ сохраняется негативное и предвзятое отношение, что мешает эффективной профилактике заболевания [2]. Проводилось исследование отношения женщин к ВИЧ-инфицированным (ВИЧ+) и осведомленность в вопросах ВИЧ-инфекции.

Цель исследования: исследовать отношение женщин к ВИЧ-инфицированным и осведомленность в вопросах ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы: при исследовании были использованы социологический и статистический методы. Участникам предлагалось пройти авторскую анкету, состоящую из закрытых и открытых вопросов об отношении к ВИЧ-инфицированным и об осведомленности в профилактике ВИЧ. Исследование проводилось с применением дистанционных технологий на платформе «Google forms», что позволило обеспечить анонимность, добровольность и получить данные от значительного количества респондентов. В исследовании приняли участие 403 женщины, средний возраст $27,9 \pm 10,55$ лет. Критериями невключения являлись заведомо неправильные данные (пропуски в анкете и др.). Для статистической обработки данных применялся статистический пакеты Microsoft Excel, STATISTICA 10.

Результаты: пути передачи в большинстве были указаны верно, некоторые выбрали варианты: “при укусах насекомых” 9,2% (37/403), 11,2% (45/403) — “при поцелуе”. Кроме того, респонденты сами предложили варианты: “через общественный транспорт”, “при кашле и чихании”, “через ношение одежды ВИЧ — инфицированного”. Считают, что ВИЧ может передаваться через прикосновение неповрежденной кожи — 2,5% (10/403), 2,7% (11/403) — не смогли ответить, при этом согласятся на рукопожатие — 84,8% (342/403), на объятия — 82,8% (334/403). Возможность заражения при совместном приеме пищи с ВИЧ+ человеком отметили 4,5% (18/403), 4,9% (20/403) — не смогли ответить. Уверены, что ВИЧ+ можно посещать общественный бассейн, баню, сауну 62,7% (253/403). Считают опасным находиться в одном помещении с ВИЧ-инфицированным 1,9% (8/403), необходимым изолировать — 4,5% (18/403). Согласились бы, чтобы родственник работал с ВИЧ-инфицированным человеком 72,2% (293/403). Относят себя к группе риска 57,3% (231/403) респондентов. В качестве способов профилактики респонденты предлагали: “наличие одного сексуального партнера”, “соблюдение гигиены”, “ведение “нормального/порядочного” образа жизни”, не употребление наркотиков, использование услуг только проверенных салонов. Нуждаются в дополнительной информации 44,4% (179/403). Некоторые респонденты в свободном поле указали на наличие у них иррационального страха зараженных людей и эмоционального неприятия ВИЧ-инфицированных.

Выводы: большинство опрошенных хорошо относятся к ВИЧ-инфицированным, но у некоторых респондентов есть эмоциональное неприятие зараженных людей, склонность к дискриминации и заблуждения о путях передачи.

Литература

1. [Электронный ресурс]: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/women-pov_ru_0.pdf (Дата обращения 19.03.21)
2. Trends in the epidemic process of HIV infection in the Voronezh Region / TA Mamchik, TN Sitnik, AV Khaperskov, IA Valyavskaya // Journal of Infectology. — 2017. — Volume 9, No. 4, Annex 1. — P. 62 — 64.