

МЕЛАНОМА ХОРИОИДЕИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПО ДАННЫМ МГКОД ЗА 2000-2019 ГГ

Шумякова Ю. С., Ващёнок Н. И.

Научный руководитель: к.м.н. доцент Семак Г.Л.

Кафедра глазных болезней

Белорусский государственный медицинский университет

Контактная информация: Ващёнок Надежда Игоревна — студентка 6 курса Лечебного факультета.

E-mail: vashyonoknadia@mail.ru

Ключевые слова: меланома сосудистой оболочки глаза, брахитерапия, энуклеация глазного яблока.

Актуальность исследования: меланома сосудистой оболочки глаза является одной из самых частых внутриглазных опухолей и составляет среди них, по данным разных авторов, от 50 до 80%. Вместе с тем меланома сосудистой оболочки глаза является и одной из самых злокачественных опухолей человека.

Цель исследования: изучить выживаемость пациентов с меланомой сосудистой оболочки глаза и частоту рецидивов.

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ выписок из медицинских карт пациентов со злокачественными новообразованиями МГКОД 138 пациентов за 2000-2019 гг. Верификация диагноза — гистологический метод исследования биоптата. Лечение пациентов проводилось на базе РНПЦ ОМР. Средний возраст составил $58,3 \pm 12,5$ лет, медиана возраста 59 лет, доля женщин 56,5% (78), доля мужчин 43,5% (60). Всем пациентам было проведено лечение на различных стадиях заболевания: хирургическое, лазерное, брахитерапия. Выживаемость рассчитывали по первому методу лечения.

Для анализа данных использовались программы Microsoft Excel и Statistics SPSS (метод Каплан-Мейер).

Результаты: по классификации TNM меланома сосудистой оболочки глаза была выявлена: T1N0M0 — 6 (4,3%), T2N0M0 — 60 (43,5%), T3N0M0 — 62 (45,0%), T4N0M0 — 9 (6,5%), на стадии впервые выявленных отдаленных метастазов 1 человек (0,7%) — T2N0M1. Всем пациентам было проведено лечение в виде энуклеации глазного яблока, лазерной терапии или брахитерапии. Лазерная терапия была проведена 6 пациентам, среднее время дожития составило $81,2 \pm 31,2$ месяца. Брахитерапия проведена 27 из 138 пациентам, среднее время дожития составило $97,3 \pm 45,8$ месяцев. Энуклеация глазного яблока выполнена 105 из 138 пациентам, среднее время дожития составило $97,3 \pm 64,1$ месяцев. У 79,7% пациентов признаков рецидива заболевания выявлено не было. Рецидив возникал в течение 1–5 лет.

Выводы: выживаемость пациентов с меланомой сосудистой оболочки глаза не зависит от выбранного метода лечения: брахитерапия — $97,3 \pm 45,8$ месяцев и энуклеация глазного яблока — $97,3 \pm 64,1$ месяцев, лазерная терапия — $81,2 \pm 31,2$ месяца. У 79,7% пациентов признаков рецидива заболевания выявлено не было. Рецидив возникал в течение 1–5 лет.

Литература

1. Бровкина А.Ф. Современные аспекты лечения меланом хориоидеи: проблемы, дискуссионные вопросы // Вестн. Офтальмол. 2006; 122 (1): 13-15.
2. Науменко Л.В., Хильченко Е.И., Залуцкий И.В. и др. Анализ некоторых статистических показателей по состоянию заболеваемости меланомой увеального тракта в Республике Беларусь за период 2000-2009 гг. // Новости хирургии. — 2011. — Т. 19. — N. 1 — С. 88–93.
3. Treatment of uveal melanoma: where are we now? / Jessica Yang, Daniel K. Manson, Brian P. Marr and Richard D. Carvajal // Therapeutic Advances in Medical Oncology — 2018. — №10. — P. 1–17