

СЕКЦИЯ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ

ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ*Бакутина Ю. Ю.*

Научный руководитель: ассистент Протопопова Алла Михайловна
Кафедра психиатрии и наркологии
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Контактная информация: Бакутина Юлия Юрьевна — студентка 5 курса Лечебного факультета
E-mail: yul.bakutina@yandex.ru

Ключевые слова: психические расстройства, эндокринная патология, психосиндром

Актуальность исследования: в настоящее время установлено, что клиническая картина эндокринной патологии часто сопровождается изменением психического статуса данной категории пациентов. Выделяют определенные закономерности развития психических изменений у людей с преобладанием тех или иных расстройств в общей структуре синдрома заболевания.

Цель исследования: определение причин, способствующих развитию нарушений деятельности эндокринных желез, в современном обществе, выделить отдельно психогенные (нервно-психические, сильные или же длительно действующие факторы, рассмотреть отдельно отрицательное действие на личность), так как эндокринные заболевания являются распространенной формой в общей структуре патологических состояний.

Материалы и методы: нами было проанализировано более 50 литературных источников, научных публикаций, как отечественных, так и зарубежных по проблеме пациентов с психическими расстройствами и эндокринной патологией.

Результаты: возникновение эндокринного психосиндрома на фоне развития эндокринопатий связывают прежде всего с органическим психосиндромом, структурно представленным снижением психической активности, изменением настроения, влечений, инстинктов, астенией, а также аффективными расстройствами. Данные симптомы выражены в разной степени. [2]

Смена настроения чаще всего носит смешанный характер: депрессивно-апатический, депрессивно-дисфорический, характеризующиеся раздражительностью и недовольством всем происходящим, а также лабильностью с явлениями раздражительной слабости.

При повышенной функции ЩЖ (тиреотоксикоз) расстройства психики являются одним из самых ярких симптомов данного заболевания, что обуславливается токсическим действием тироксина. [3] Здесь характерно преобладание эмоционально-волевого расстройства в виде эмоциональной лабильности, аффективные расстройства, астеническая симптоматика, а также обидчивость и ранимость, возникающие при реакции раздражения и недовольства. [1] Данной группе больных свойственна крайняя несдержанность, вспыльчивость, склонность к быстро истощающимся аффективным вспышкам. Пациентов постоянно сопровождает внутреннее напряжение, беспокойство, часто возникают трудности с засыпанием, нередко характерны пробуждения с тревожными сновидениями, понижение настроения, доходящее в отдельных случаях до депрессии с тревожностью. Встречаются случаи с психотическими изменениями в виде психозов с нарушением сознания.

Выводы: после анализа работ, направленных на изучение психоэндокринных состояний, можно сделать вывод, что психические расстройства являются одним из симптомов в структуре эндокринного заболевания, на которые часто не обращают внимание многие эндокринологи. Прежде всего они обусловлены поражением центральной нервной системы под действием гормональных изменений, которые оказывают воздействие на обменные процессы в головном мозге. Поражение желез внутренней секреции и проявление психических расстройств в системе психоорганического синдрома имеют свои особенности в зависимости от уровня поражения и заболевания.

Литература

1. Коркина М.В., Лакошина Н.Д., Личко А.Е., Сергеев И.И. Психиатрия. М.: МЕДпресс-информ. 2004. — 576 с.
2. Коркина М. В. Психические нарушения при эндокринных заболеваниях // Психиатрия. — М., 2004. — 3-е изд. — С. 316–327.
3. Wittchen H–U, Jakobi F. Size and burden of mental disorders in Europe — a critical review and appraisal of 27 studies. EurNeuropsychopharmacol 2005; 15: 357–76.