

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ШИЗОФРЕНИИ И ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В 2020 ГОДУ

Ганиханов А. А.

Кафедра психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Контактная информация: Ганиханов Абдурахим Абдухамитович, ассистент кафедры
E-mail: aganikhanov@gmail.com

Ключевые слова: эпидемиология психиатрии, распространенность, заболеваемость, психические заболевания

Актуальность исследования: изучение комплекса факторов, способных оказать влияние на распространенность заболеваемости психическими расстройствами и, в частности, шизофренией, является одной из актуальных задач здравоохранения Республики Узбекистан, имеющей как научное, так и практическое значение.

Цель исследования: демонстрация динамики показателей заболеваемости шизофренией и психическими расстройствами за 3 года для прогноза уровня заболеваемости.

Материалы и методы: изучены статистические данные показателей распространенности и первичной заболеваемости психическими расстройствами и шизофренией за 2017, 2018, 2019 годы.

Результаты: в 2017 году по республике было зарегистрировано 351071; в 2018 году — 341529; в 2019 году — 331198 лиц с общим числом психических нарушений. Число больных с психическими расстройствами с впервые в жизни установленным диагнозом составило: в 2017 году — 12350; в 2018 году — 11606 и в 2019 году 10892 человек. При этом число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом шизофрении и взятыми на диспансерный учет составило: в 2017 году — 2063, в 2018 году — 1916 и в 2019 году 2415 человек. При стабильной динамике снижения уровня распространенности психическими расстройствами, отмечается некоторый рост показателей заболеваемости шизофренией.

Выводы: получаемые с помощью эпидемиологического метода данные о психической заболеваемости и болезненности населения (составляющие предмет описательной эпидемиологии) являются ведущей предпосылкой в решении многих практических вопросов. Рост показателя первичной заболеваемости шизофренией на фоне уменьшения показателя общей заболеваемости свидетельствует о своевременном выявлении больных. Эти данные являются базисом при разработке научно обоснованного планирования психиатрической помощи — определении штатных других нормативов. С учетом тенденции динамики заболеваемости и болезненности, а также особенностей развития демографических изменений в населении возможно длительное планирование организации психиатрической помощи.

Литература

1. Ганиханов А.А. Анализ заболеваемости психическими расстройствами в Республике Узбекистан // Неврология. — Ташкент, 2008. — № 1 — с. 22–24