

СОВРЕМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ГЕРНИОПЛАСТИКИ

Григорьева И. А., Эдилов Р. У.

Научный руководитель: Дзахов В.Р.
Кафедра хирургических болезней № 1
Северо-Осетинская государственная медицинская академия

Контактная информация: Григорьева Ирина Александровна — студентка 5 курса Лечебного факультета.
E-mail: grigirina31@mail.ru

Ключевые слова: герниопластика, паховые грыжи.

Актуальность исследования: На сегодняшний день проблема лечения грыж в хирургии остается актуальной. В неотложной хирургии грыжесечение является одним из наиболее частых вмешательств. Герниопластика — это удаление грыжевого выпячивания при помощи хирургического вмешательства [1]. Выделяют три вида герниопластики: 1-ненатяжная, 2-натяжная, 3-комбинированная. В наши дни предпочтение отдают ненатяжному методу, в процессе которого не происходит растяжения тканей и возникновение рецидивов минимально [2]. По способу проведения операций выделяют: 1-открытый, 2-лапароскопический. Грыжесечение по Лихтенштейну является самым часто применяемым среди ненатяжного способа пластики грыж, так как травматизация тканей сведена к минимуму [3].

Цель исследования: Проанализировать результаты оперативного лечения паховых грыж на базе КБ СОГМА.

Материалы и методы: В проведенном ретроспективном исследовании были изучены 179 историй болезни пациентов с паховыми грыжами, с 2016 по 2020 год в хирургическом отделении КБ СОГМА. Применяемая методика: пластика по Лихтенштейну, пластика по Бассини, лапароскопическая пластика.

Результаты и их обсуждения: По данным исследования частота встречаемости паховых грыж у мужчин составила 166: в 2016 году — 36, в 2017 — 33, в 2018 — 29, в 2019 — 30, в 2020 — 38. Частота встречаемости паховых грыж у женщин составила 13: в 2016 — 2, в 2017 — 3, в 2018-4, в 2019 — 3, в 2020 — 1. В числе операций в отношении паховых грыж на часть правосторонних доводится 63 операций (это 35,2% от суммарного числа операций). На часть двусторонних грыж приходится 56 операций (31,3%). На часть операций в отношении левосторонних грыж приходится 58 (32,4%). В результате анализа оперативного лечения паховых грыж мы получили следующие результаты: пластика по Лихтенштейну была проведена 165 пациентам из них 0 рецидивов, 0 летальности, пластика по Бассини 6 пациентам: 0 рецидивов, 0 летальности, лапароскопическая пластика 6 пациентам: 0 рецидивов, 0 летальности. Осложнения: водянка 52%, инфицирование раны: 8%, повреждение кишки 16%, гематома 25%.

Выводы: В ходе исследования, проведенного в рамках герниопластики паховых грыж мы определили, что самыми малотравматичными операциями, способствующими быстрой регенерации, являются операции по Лихтенштейну и по Бассини.

Литература

1. Жуков, Б.Н. Хирургия: Учебник / Б.Н. Жуков. — М.: Academia, 2018 — 126 с.
2. Рубан, Э.Д. Хирургия: Учебник / Э.Д. Рубан. — Рн/Феникс, 2017. — 144
3. Гостищев, В. Общая хирургия /В. Гостищев. — М.: Гэотар-Медиа, 2016. — 736 с