

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

© Байрамалиева Г.Ф.

Научный руководитель: к.м.н. Мейланова Ф.В.

Дагестанский государственный медицинский университет. Россия. Махачкала

RESULTS OF TREATMENT OF CHILDREN WITH ACUTE GASTROINTESTINAL BLEEDING

© Bayramaliev G.F.

Research supervisor PhD Meylanova F.V.

Дагестанский государственный медицинский университет. Russia. Makhachkala

Актуальность. Желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) — истечение крови в просвет желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Эту проблему нельзя рассматривать как отдельное заболевание — является осложнением самых различных патологий. ЖКК представляет опасный симптом, который требует немедленного определения его причины и устранения.

Цель. Выработать алгоритм диагностики и методов лечения ЖКК.

Материалы и методы. В отделение ЭГХ ДРКБ за последние годы находились на лечении 54 детей с ЖКК. Мальчиков 33 (61,1%), девочек 21 (38,9%). Возраст: до 5 лет — 15 (27,7%), 5–10 — 22 (40,7%), старше — 17 (31,6%). Причины кровотечения: портальная гипертензия, кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода — 13 (24%), язвенной болезни и 12 перстной кишки — 15 (27,8%), эрозивный гастродуоденит, после приема гастроагрессивных препаратов — 14 (25,9%), дивертикула Меккеля — 12 (22,3%). В тяжёлом состоянии поступило 31 (57,4%), средней тяжести — 23 (42,6%). Кроме клинического статуса, применялись ФГДС, УЗИ, лапароскопия.

Результаты. Из 54 больных, консервативно пролечено 36 (66,6%), оперировано 18 (33,4%). Больные с портальной гипертензией (13) — в большинстве случаев эти дети ранее поступали в отделение, были на консультации в Федеральных профильных центрах, предполагаются оперативные вмешательства — сосудистые анастомозы. Эти больные, после стабилизации состояния, также направлены в профильные центры. Больные с язвенным кровотечением (15) — оперированы — 6, консервативно пролечено — 9. Дети с эрозивным гастродуоденитом — консервативно. 12 детей с дивертикулом Меккеля оперированы (лапароскопия — 8, лапаротомия — 4). Осложнений и летальности не было. Все дети выписаны с улучшением и выздоровлением.

Выводы. Основная проблема возникновения ЖКК — назначение гастроагрессивных препаратов врачами без учета возраста, вида медикаментов и степени медицинской грамотности родителей. Часто, при определённых ситуациях родители сами дают данные препараты детям, что приводит к осложнениям со стороны ЖКТ.