

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АТРЕЗИЙ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ

© Дворниченко А. А., Птицын В.А., Коряшкин П.В., Баранов Д.А.

Научный руководитель: д.м.н., профессор Вечеркин В.А.

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко. Россия. Воронеж

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF ESOPHAGEAL ATRESIA IN CHILDREN

© Dvornichenko A. A., Ptitsyn V.A., Koryashkin P.V., Baranov D.A.

Research supervisor DMedSci, Professor Vecherkin V.A.

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н.Бурденко. Russia. Voronezh

Цель. Изучить, что изменилось в методах диагностики атрезий пищевода с 2016 года.

Материалы и методы. Анализ историй болезней, протоколов операций.

Результаты. Атрезия пищевода — порок развития, при котором верхний и нижний сегменты пищевода разобщены. При этом один или оба сегмента могут иметь сообщение с трахеей.

В условиях хирургического отделения Воронежской областной клинической больницы № 1 с 2016 по 2020 гг. было оперировано 26 пациентов с атрезией пищевода. Из них 23 пациента были с атрезией пищевода с трахеопищеводным свищем и 3 пациента с безсвищивыми атрезией пищевода. У 5 пациентов трахеопищеводный свищ был разделен, а у 18 детей после его разделения наложен эзофаго-эзофаго анастомоз. Хирургическое лечение без свища пищевода производилось путем наложения анастомоза путем наложения гастростомии и шейной эзофагостомии.

Для диагностики данной патологии используется пренатально-ультрасонография (УЗИ), постнатальном периоде — установка назоезофагеального зонда с последующей рентгенографией с контрастом. При УЗИ многоводие может присутствовать, но не является диагностическим признаком. При этом желудочный пузырь у плода, как правило, может отсутствовать, но только в < 50% случаев. Реже встречается делятированный верхний мешок пищевода.

Выводы. Таким образом, с проведением УЗИ в пренатальном периоде и рентгениягностики после рождения стало возможно своевременно диагностировать эту патологию и выбирать оптимальный метод лечения. Это позволяет снизить летальность и улучшить качество жизни новорожденных.