

АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ

© Носиров У.А., Рахимова Ф.Ш., Султанбаев Ш.А.

Научный руководитель: д.м.н. Юсупов Ш.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра детской хирургии № 1.
Узбекистан. Самарканд

ANALYSIS OF SURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF APPENDICULAR PERITONITIS IN CHILDREN

© Nosirov U.A., Rakhimova F.S., Sultanbaev S.A.

Research supervisor DMedSci Yusupov S.A.

Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра детской хирургии № 1.
Uzbekistan. Samarkand

Цель. Улучшить результаты лечения АП у детей.

Материалы и методы. Работа основана на анализе результатов диагностики и лечения 245 больных с АП в возрасте от 1 года до 16 лет, находившихся на стационарном лечении во 2-й клинике Самаркандского медицинского института за период с 2017 по 2020 гг.

По распространенности наблюдались следующие формы перитонита: из 245 больных у 177 (72,2%) был местный, у 47 (19,2%) — диффузный и у 21 (8,6%) — разлитой АП.

Для анализа результатов лечения больные были разделены на две группы. Основную группу (ОГ) составили 12 (4,9%) больных, которым была проведена лапароскопическая операция. В данной группе было 8 (66,7%) местных перитонитов, диффузных — 3 (25,0%) и разлитого — 1 (8,3%). Контрольную группу (КГ) составили 233 (95,1%) пациента, оперированных традиционными способами. В КГ вошли 169 (72,5%) детей с местным перитонитом, 44 (18,9%) — с диффузным и 20 (8,6%) — с разлитыми перитонитами.

Результаты. Сравнительный анализ непосредственных результатов лечения АП в группах показал, что при лапароскопическом методе оперативного лечения больных АП косметический эффект бесспорен, количество послеоперационных интраабдоминальных осложнений уменьшилось с 10% до 2,5%, количество повторных хирургических вмешательств с 14 до 3,6%, снижение койко-дня с $12,1 \pm 1,2$ до $8,6 \pm 1,3$ дня. Летальных исходов в обеих группах больных не было.

Выводы. Таким образом, лапароскопия позволяет улучшить результаты хирургического лечения АП за счет отличного косметического эффекта, уменьшения количества повторных оперативных вмешательств, сокращения сроков пребывания больных в стационаре.