

ТИПИЧНАЯ КОСОЛАПОСТЬ

© Пахомова Т.И.

Научный руководитель: д.м.н. Вавилов М.А.

Ярославский государственный медицинский университет. Кафедра детской хирургии. Россия. Ярославль

TYPICAL CLUBFOOT

© Pakhomova T.I.

Research supervisor PhD Vavilov M.A.

Ярославский государственный медицинский университет. Кафедра детской хирургии. Russia. Yaroslavl

Цель. Оценка эффективности применения метода Понсети в лечении типичной идиопатической косолапости у детей грудного возраста.

Материалы и методы. в 2006 году в клиниках города Ярославля произошла смена тактики лечения детей грудного возраста с идиопатической косолапостью с традиционной на метод Игнасио Понсети. Нами проанализированы сроки лечения, степень хирургической агрессии, количество рецидивов и их тяжесть, а также тактика лечения в случае потери коррекции на фоне роста в обеих группах.

Результаты. опираясь на проведенное исследование мы убедились в группах сравнения, что при смене тактики лечения детей с идиопатической врожденной типичной косолапостью методом Понсети показал явные преимущества по всем показателям сравнения. Он был эффективен у 98% детей. Количество рецидивов деформации стоп после 2006 года сократилось на 50 процентов. В случае рецидива косолапости на фоне роста или погрешности в ношении брейсов лечение заключалось в повторном гипсовании, ахиллотомии и пересадке сухожилия передней большеберцовой мышцы на третью клиновидную кость, что имело явные преимущества перед традиционными принципами лечения детей с косолапостью.

Выводы. Метод И. Понсети выгодно отличается скоростью коррекции деформации и в 98% случаев позволяет пролечить детей, не прибегая к общей анестезии.

Выявлена прямая корреляция между лечением по методу Понсети и снижением количества рецидивов и осложнений.

Методика И. Понсети должна являться стартовым методом в лечении косолапости у детей грудного возраста.

Необходимо заниматься популяризацией данного метода на территории Российской Федерации, как среди родителей детей с косолапостью, так и среди обучающихся в ВУЗах и средних медицинских учебных заведениях.