ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕДКОЙ VACTER ASSOCIATION У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

© Проплеткина К.Д., Ерохина Н.О.

Научный руководитель: к.м.н. Шумихин В.С.

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. Россия. Москва

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF RARE VACTER ASSOCIATION IN A NEWBORN BABY

© Propletkina K.D., Erokhina N.O.

Research supervisor PhD Shumikhin V.S.

Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. Russia. Moscow

Цель. Клиническое наблюдение пациента с редкой формой сочетания пороков развития — VACTER ассоциацией.

Материалы и методы. Ретроспективный анализ истории болезни пациента.

Результаты. Антенатально у ребенка был выявлен мегауретер, сразу после рождения — атрезия ануса. С 1 суток жизни девочка находилась в ДГКБ им. Н.Ф. Филатова для проведения обследований и лечения.

На УЗИ выявлено значительное расширение левого мочеточника, инфекция мочевыводящих путей. Выполнена цисто-вагиноскопия: проведена интубация устья мочеточника слева, которое было эктопировано в шейку мочевого пузыря, и визуализирована кишечная фистула по задней стенке влагиалища. Наложена раздельная колостома. На ЭХО-КГ обнаружены врожденные пороки сердца: дефект межжелудочковой перегородки и открытое овальное окно. После выявления множества пороков развития нескольких систем органов ребенок был консультирован генетиком. Диагностирована VACTER ассоциация.

В возрасте 3,5 месяцев по данным РИИ — выраженные диффузно-очаговые изменения в паренхиме левой почки, секреторная функция снижена на 78%; викарная гипертрофия правой почки. Учитывая рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, с целью обеспечения дедривации мочи выведена дистальная уретерокутанеостома слева. В 6 месяцев проведена задне-саггитальная аноректопластика. В 11 месяцев выполнено повторное РИИ — выявлено снижение секреторной функции левой почки на 80%, викарная гипертрофия правой почки. Выполнена лапароскопическая нефроуретерэктомия, закрытие колостомы. В настоящее время ребенок наблюдается амбулаторно.

Выводы. VACTER ассоциация — редкое сочетание пороков, характеризующееся разнородностью клинической симптоматики, что связано с поражением многих систем органов. В диагностике данного заболевания необходим коллегиальный подход и разработка индивидуальной программы коррекции пороков для каждого пациента, что позволит сократить количество госпитализаций и анестезиологических пособий при достижении полной коррекции пороков