

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРИТОНИТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

© Сухова А.А., Джумалиев З.Т.

Научный руководитель: к.м.н., доцент В.А Завьялкин

Самарский государственный медицинский университет. Россия. Самара

IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF WIDESPREAD PERITONITIS IN CHILDREN

© Sukhova A.A., Dzhumaliev Z.T.

Research supervisor PhD in Medicine, docent Zavyalkin V.A.

Самарский государственный медицинский университет. Russia. Samara

Цель. Совершенствование комплексного лечения распространенного перитонита различного генеза, с помощью применения в терапии комбинированных препаратов.

Материалы и методы. Материалом исследования послужил наш опыт лечения пациентов с распространенным гнойным перитонитом. Обследовано 339 детей в возрасте от 1 до 15 лет, находившихся на лечении в данном отделении с 2006 г. Из них у 237 кроме стандартной хирургической тактики и современного антибактериального лечения в патогенетической терапии применялся Реамберин, у 58 пациентов кроме Реамберина использовался Ремаксол, у 20 — применялась вено-венозная мультифльтрация, все дети получали нутритивную поддержку. В группу сравнения вошли 102 ребенка с распространенным гнойным перитонитом, у которых использовалась стандартная терапия: применение в инфузионной терапии растворов кристаллоидов и коллоидов (5 и 10% р-р глюкозы, 0,9% р-р натрия хлорида, волювен, 10% р-р альбумина).

Результаты. Статистическое исследование данных больных выявило, что у детей с распространенным гнойным перитонитом, получавших оптимизированное лечение, происходит более быстрое снижение в динамике показателей интоксикации — лейкоцитоза, ЛИИ, температуры тела; быстрее купируется энтеральная недостаточность. Обнаружено более раннее восстановление белково-синтетической функции печени и уменьшение цитолитического и мезенхимально-воспалительного синдромов, особенно при применении Ремаксолола.

Выводы. Совершенствование патогенетической терапии, включающей применение комбинированных препаратов: антигипоксанта Реамберина и комбинированного гепатопротектора Ремаксолола, трофического питания специализированными препаратами, применение аппаратной вено-венозной мультифльтрации в лечении распространенных перитонитов различного генеза является обоснованным и весьма необходимым.