

КИСТОЗНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕВОЧЕК

© Умриллов Л.Г., Аблятифов А.Б., Умруллоева Ж.Г.

Научный руководитель: д.м.н., профессор Шамсиев Ж.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра детской хирургии № 1.
Узбекистан. Самарканд

CYSTIC FORMATIONS OF THE ABDOMINAL CAVITY IN GIRLS

© Umrilloev L.G., Ablatfov A.B., Umrulloeva J.G.

Research supervisor DMedSci, professor Shamsiev J.A.

Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра детской хирургии № 1.
Uzbekistan. Samarkand

Цель. Улучшение диагностики и лечения кистозных образований брюшной полости у девочек.

Материал и методы. Наша клиника имеет опыт лечения кист брюшной полости у 31 девочки, за период с 2017 по 2020 год. Возраст пациенток колебался от 1 года до 18 лет. Кисты локализовались преимущественно в яичниках 22 (71%), затем 6 (19%) в стенке кишки и брыжейке, 2 (6,5%) кисты селезенки и 1 (3,5%) кисты мочевого пузыря. Чаще всего больные предъявляли жалобы на пальпируемое образование в брюшной полости. Жалоб не предъявляли 13 (42%) больных. Длительность клинических проявлений колебалась от нескольких часов до 5 мес. Основным методом диагностики кист брюшной полости является ультразвуковое исследование и компьютерная томография. С осложненными кистами брюшной полости больные обращались в клинику с признаками «острого живота». В нашей практике после морфологического исследования удаленных кист из полости живота были обнаружены истинные кисты.

Результаты. Выбором лечения данных пациентов была видеолапароскопическая операция, последняя была выполнена у 26 (84%) больных. После видеолапароскопической операции осложнений у таких больных не было, послеоперационный период протекал гладко, сроки пребывания больных в стационаре сократились, отмечался хороший косметический результат.

Выводы. Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о сложности диагностики кист брюшной полости на основании только клинических данных. Видеолапароскопия — один из возможных высокоинформативных и относительно безопасных методов диагностики и лечения кист брюшной полости у девочек, особенно осложненных разрывом и нагноением.