

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ЭХИНОКОКТОМИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ ЭХИНОКОККОВЫХ КИСТ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ

© Хасанов А.Б., Содиков У.У., Мамадиёров О.А.

Научный руководитель: д.м.н., профессор Шамсиев Ж.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра детской хирургии № 1.
Узбекистан. Самарканд

LAPAROSCOPIC ECHINOCOCTOMY OF MULTIPLE ECHINOCOCCAL LIVER CYSTS IN CHILDREN

© Khasanov A.B., Sodikov U.U., Mamadiyorov O.A.

Research supervisor DMedSci, professor Shamsiev J.A.

Самаркандский государственный медицинский университет, кафедра детской хирургии № 1.
Uzbekistan. Samarkand

Цель. Анализ результатов лапароскопической эхинококэктомии при множественных эхинококковых кистах печени у детей.

Материал и методы. В период с 2017 по 2021 годы во 2-й клинике СамМИ лапароскопическая эхинококэктомия печени выполнена 48 детям. Мальчиков было 20 (41,7%), девочек 28 (58,3%). Детей до 5 лет было 8 (16,7%), от 5 до 10 лет — 23 (47,9%), от 10–14 лет — 13 (27,1%), старше 14 лет — 4 (8,3%). Для диагностики эхинококковых кист использовали УЗИ, КТ и МРТ. Одиночные эхинококковые кисты были у 28 больных, множественные (от 2 до 6 кист) встречались у 20 больных.

Результаты. В 45 случаях лапароскопическая эхинококэктомия была успешной, у 3 (6,25%) больных выполнена конверсия с завершением операции лапаротомным доступом. Причинами перехода на лапаротомию явились множественные мелкие дочерние кисты. Для полной санации остаточной полости выполняли минилапаротомию в зависимости от локализации кисты подреберно или верхнесрединно. В двух случаях (4,1%) отмечено нагноение остаточной полости после удаления «гигантской» эхинококковой кисты печени. Обоим пациентам была произведена релапароскопическая санация остаточной полости печени с дренированием остаточной полости. Ни в одном случае во время операции не было выявлено желчного свища.

Выводы. Лапароскопическая эхинококэктомия печени при соблюдении указанных выше условий не уступает по качеству результатам традиционного лапаротомного доступа. Меньший срок стационарного лечения, а также традиционные для лапароскопической хирургии преимущества ранней реабилитации и хороший косметический эффект делают вышеуказанный вариант эхинококэктомии печени операцией выбора.