

ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ ИСХОДОВ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМЫ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ

© Чернов Д.В., Залаяева Р.В.

Научный руководитель: д.м.н. Морозов В.И.

Казанский государственный медицинский университет. Россия. Казань

EVALUATION OF LONG-TERM OUTCOMES OF CONSERVATIVE TREATMENT OF KIDNEY INJURY IN CHILDREN

© Chernov D.V., Zalyaeva R.V.

Research supervisor DMedSci Morozov V.I.

Казанский государственный медицинский университет. Russia. Kazan

Цель. Целью данного исследования являлось изучение отдаленных результатов лечения травматического повреждения почек у детей с различной степенью повреждения, пролеченных в условиях урологического стационара ДРКБ МЗ РТ за 2021 год.

Материалы и методы. Предметом исследования было изучение отдаленных результатов лечения семи пациентов с травмами почек, пролеченных консервативно в урологическом отделении ДРКБ МЗ РТ в течение 2021 года. Возраст пациентов от 8 до 13 лет. Распределение по полу: девочек 2, мальчиков 5. По характеру повреждения у троих детей была травма почки 1 степени, у двоих — 2 степени и у двоих — 3 степени. Применялись следующие методы исследования: изучение анамнеза заболевания, морфологии повреждения почек по данным истории болезни и катamnестические исследования в виде опроса родителей по специально разработанной анкете. В анкете были поставлены следующие вопросы: имеются ли жалобы на данный момент, случались ли обострения инфекции мочевыводящих путей, регистрировались ли повышения уровня артериального давления после выписки? Также у четверых детей были оценены результаты общего анализа крови, общего анализа мочи и ультразвукового исследования почек с доплерографией, проведенные после выписки из стационара на сроках от 1 до 3 месяцев.

Результаты. По данным катamnестического исследования у всех больных отсутствовали какие-либо жалобы, не отмечалось рецидивирующей инфекции мочевыводящих путей, не регистрировалась нефрогенная гипертензия и у 4 пациентов по данным ультразвукового исследования почек с доплерографией отсутствовали гемодинамические нарушения в паренхиме почки.

Выводы. Таким образом, избранная тактика лечения у всех обследованных нами детей с травмой почки была оптимально правильной, о чем свидетельствуют результаты катamnестического обследования на сроках от 3 до 4 месяцев после перенесенной травмы.