

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У МАТЕРЕЙ ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Заступова Анна Алексеевна, Березкина Елена Николаевна, Сергиенко Ольга Игоревна

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет. 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2

E-mail: prozorova-anyu@mail.ru

Ключевые слова: новорожденные; матери; медико-социальная характеристика; заболевания.

Введение. Здоровье детей одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития ребёнка. Неслучайно приоритет здоровья детей является одним из ведущих принципов охраны здоровья в нашей стране. В условиях низкой рождаемости особенно важной становится борьба за жизнь и здоровье каждого новорождённого [1, 2]. В подтверждение особого внимания государства к проблемам сохранения и укрепления детского здоровья является Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года N 240, согласно которому 2018–2027 годы были объявлены: «Десятилетием детства» в России. В связи с чем, разрабатываются и внедряются в деятельность медицинских организаций значительное количество программ и проектов, направленных на укрепление и сохранения здоровья детей, начиная с рождения [3].

Период новорожденности — сложный этап, время напряженной адаптации к изменившимся условиям окружающей среды. Ребенок в этот период зависим не только от матери, но и от уровня медицинской помощи и ухода, который осуществляется в организациях родовспоможения, где он проводит большую часть раннего неонатального периода [4, 5]. Таким образом, организация медицинской помощи новорожденным имеет важное значение для их дальнейшего физического и нервно-психического развития.

Цель исследования. Выявить особенности медико-социальной характеристики и течения беременности у матерей здоровых и больных новорожденных детей.

Материалы и методы. На базе ГБУЗ «Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца» и Перинатального центра ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России методом случайной выборки было проведено анонимное анкетирование 379 родителей новорожденных детей. Математическая обработка данных проведена с использованием программы Microsoft Excel.

Результаты. В ходе исследования было установлено, что средний возраст матери в основной — $31,05 \pm 0,5$ года и в контрольной группе составил — $26,73 \pm 0,3$ года. Анализ характеристик семьи показал, что подавляющее большинство детей грудного возраста (72,15%) родились в полных семьях как в основной, так и в контрольной группе. В основной группе в зарегистрированном браке проживали 76,5%, в гражданском браке 18,5%, разведённых 1,6%, в браке не состояли и не состоят — 3,3% женщин. В контрольной группе в зарегистрированном браке проживали 67,4%, в гражданском браке 16,9%, разведённых 8,7%, вдовы составляли 0,5%, в браке не состояли и не состоят — 6,6% женщин. Анализ образования родителей показал, что подавляющее большинство из них имеют высшее образование в обеих группах. Высшее образование в основной группе имели 54,1% матерей и в контрольной группе — 53,6% матерей.

В основной группе женщины встали на учёт в 1 месяц — 4,4%, во 2 месяц — 52,5%, в 3 месяц — 40,9%, в 4 месяц — 2,2%. Женщины в контрольной группе встали на учёт в 1 месяц — 22,5%, во 2 месяц — 50,5%, в 3 месяц — 22,9%, в 4 месяц — 4,1%.

Длительность беременности у женщин в основной группе составляла 6 месяцев у 6,6%, 7 месяцев у 22,9%, 8 месяцев у 18,6%, 9 месяцев у 51,4%, 10 месяцев у 0,5% респонденток.

Продолжительность беременности у женщин в контрольной группе составила 6 месяцев у 0,5%, 7 месяцев у 13,8%, 8 месяцев у 81,2%, 9 месяцев у 4,6%.

Осложнения беременности у женщин основной группы отмечались у 91,3% матерей, не выявлены осложнения у 8,7% женщин. Осложнения беременности у женщин контрольной группы отмечались у 55,1% матерей, не выявлены осложнения у 44,9% женщин. Первое место в структуре заболеваемости женщин во время беременности в основной и контрольной группе занимает избыточный вес 15,2% и 6,6%. Второе место в основной группе занимает ОРВИ 7,5%, а в контрольной группе второе место занимает сахарный диабет 6,5%. Третье место в структуре заболеваемости в основной группе занимает болезни системы кровообращения 6,6%, а в контрольной ОРВИ 4,4%.

Заключение. Установлено, что возраст матерей, имеющих здоровых новорожденных и новорожденных с патологией, различается. В основной группе матери старше ($31,05 \pm 0,5$ года), чем в контрольной группе ($26,73 \pm 0,3$ года). Наиболее распространенные заболевания у матерей следующие: избыточный вес, сахарный диабет и болезни системы кровообращения. Первое место в структуре заболеваний в основной группе занимает избыточный вес — 15,2%, второе место сахарный диабет — 5,06% и третье место болезни системы кровообращения — 6,5%; в контрольной группе первое место так же занимает избыточный вес наблюдали в 6,6% случаев, второе место сахарный диабет — в 6,5% и третье болезни системы кровообращения в 4,2% случаев. Значимые различия между группами обнаружены по доле женщин с избыточным весом. Также установлено, что доля матерей с осложнением беременности в основной группе выше, чем в контрольной.

Литература:

1. Моисеева К.Е. Некоторые результаты оценки динамики заболеваемости новорожденных в организациях родовспоможения. Медицина и организация здравоохранения. 2019; 3(4): С. 40–47.
2. Moiseeva K.E., Ivanov D.O., Yuryev V.K., Alekseeva A.V., Glushchenko V.A., Kharbediya S.D. Some assessment results of the medical care for newborns. Archivos Venezolanos de Farmacologia y Terapeutica. 2019; 3(38): 192–195.
3. Моисеева К.Е. Динамика и прогноз отдельных показателей доступности медицинской помощи новорожденным в Северо-Западном федеральном округе. Медицина и организация здравоохранения. 2020; 1(5): С. 18–28.
4. Юрьев В.К., Харбедия Ш.Д., Моисеева К.Е., Глушенко В.А. и др. Алгоритмы расчета деятельности медицинских организаций: Учебно-методическое пособие для студентов по направлению подготовки 34.0.01 «Сестринское дело», 2019. — СПб. Сотис-мед. — 56 с.
5. Юрьев В.К., Теблеев Ц.М., Пузырев В.Г. Репродуктивные установки женщин различных социальных групп. Современные проблемы науки и образования. 2015, 2(2): 891.