

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА РОМЕТИН ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

*Махкамова Гулноза Тураходжаевна, Шамансурова Элмира Амануллаевна.*

Ташкентский Педиатрический Медицинский институт, 100140, г.Ташкент, Юнусабадский район, ул.Богишамол, 223

E-mail: mail@tashpmi.uz

**Ключевые слова:** Острые респираторные; острые респираторные вирусные инфекции; иммуностимулирующих; поколение препаратов

**Введение.** Острые респираторные заболевания (ОРЗ) — большая группа болезней, имеющих сходные эпидемиологические, патофизиологические и клинические особенности, выделяющие их среди других инфекционных заболеваний. Подавляющее большинство ОРЗ имеют вирусную этиологию и обозначаются аббревиатурой ОРИ (ранее ОРВИ) — острые респираторные вирусные инфекции, однако и бактерии (хламидии, микоплазмы и др.), и некоторые грибы, а также простейшие рассматриваются как этиологические агенты ОРЗ. Сегодня в ряду иммуностимулирующих препаратов с доказанной высокой эффективностью в лечении и профилактике ОРЗ ведущее место заняли индукторы эндогенного интерферона — поколение препаратов универсально широкого спектра действия (арбидол, амиксин, Эргоферон, неовир, циклоферон и др.)

**Цель исследования.** Изучить клиническую эффективность и переносимость препарата РОМЕТИН таблетки 0,1 г производства Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова Академии наук Республики Узбекистан, в сравнении с традиционной терапией, включавший препарат ЭРГОФЕРОН таблетки, производства Материя Медика Холдинг НПФ, ООО (Россия). Исследование было сравнительное, открытое, рандомизированное, контролируемое, с двумя параллельными группами. Отбор больных производился из пациентов, обратившихся в семейную поликлинику. В группе, получавшей исследуемый препарат, было 30 пациентов, получавших препарат сравнения — 30 человек. Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу, диагнозу и тяжести заболевания. Средний возраст в группе, получавшей исследуемый препарат, составлял  $41,2 \pm 2,5$  года, из них мужчин было — 30% со средним возрастом 38,1 лет, женщин — 70% со средним возрастом 42,5 лет. В группе, получавшей препарат сравнения, средний возраст составлял  $43,8 \pm 2,6$  лет, из них мужчин было — 36,7% со средним возрастом 46,5 лет, женщин — 63,3% со средним возрастом 42,2 года. Препарат Рометин принимался по 2 таблетки 3 раза/сут 2 дня. Затем на 3 и 4 дни принимают по 1 таблетке 3 раза/сут, на 5-й день по 1 таблетке 2 раза/сут. В сумме 20 таблеток. Эргоферон в соответствии с инструкцией по применению.

**Выводы.** Проведенные исследования с применением Рометин таблетки 0,1 г показывают, что препарат обладает достаточной клинической активностью, эффективностью, хорошей переносимостью и может быть рекомендован для регистрации и медицинского применения в Республике Узбекистан в качестве противовирусного препарата.