

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ПОЗДНИМИ ФОРМАМИ СИФИЛИСА ПО ДАННЫМ СПБГБУЗ ГОРКВД

© Пташникова П.Д., Новикова Н.Е., Хажомия К.

Научный руководитель: проф., д.м.н. Смирнова И.О.
Кафедра инфекционных болезней и дерматовенерологии
Санкт-Петербургский государственный университет

Контактная информация: Пташникова Полина Дмитриевна — студентка 4 курса СПбГУ; Новикова Надежда Евгеньевна — ординатор 2го года кафедры инфекционных болезней и дерматовенерологии СПбГУ;
E-mail: nadyalekseev@yandex.ru

Ключевые слова: поздние формы сифилиса, поздний нейросифилис, поздний кардиоваскулярный сифилис, поздний скрытый сифилис

Актуальность исследования: сифилис остается одной из наиболее распространенных во всем мире инфекций, передающихся половым путем. В РФ в настоящее время происходит снижение заболеваемости данной инфекцией (до 15,0 человек на 100 тыс. населения). При этом происходит перераспределение форм сифилиса с преобладанием скрытых и поздних форм [1].

Цель исследования: анализ структуры заболеваемости поздними формами сифилиса и медико-социальных характеристик пациентов, имеющих диагнозы позднего скрытого сифилиса, позднего нейросифилиса, позднего кардиоваскулярного сифилиса.

Материалы и методы: истории болезней 670 пациентов венерологического отделения СПбГБУЗ ГорКВД с установленными диагнозами поздних форм сифилиса за период с 2019 по 2021 год.

Результаты: в СПбГБУЗ ГорКВД с 2019 по 2021 год получили лечение 670 пациентов с поздними формами сифилиса, из которых 410 (61,2%) имели скрытый поздний сифилис, 164 (24,5%) поздний нейросифилис, 96 (14,3%) поздний кардиоваскулярный сифилис. Примечательно, что в период с 2019 по 2021 год среди поздних форм увеличилось относительное количество позднего скрытого сифилиса (53% за 2019 год, 60,4% за 2020 год и 74,5% за 2021 год), при этом уменьшилось относительное количество позднего нейросифилиса (30% за 2019 год, 22,5% за 2020 год и 18,2% за 2021 год).

Отмечается, что за последние 3 года увеличилось относительное количество пациентов женского пола с поздними формами сифилиса (в 2019 году 37,8%, в 2020 году 41,2%, в 2021 году 42,2%).

В период с 2019 по 2021 год снизилось относительное количество лиц в возрасте от 19 до 25 лет, у которых впервые были выявлены поздние формы сифилиса (4,2% в 2019 году, 1,1% в 2020 году и 3,1% в 2021 году), а также в возрастном периоде с 56 до 60 лет (13,4% в 2019 году, 11,3% в 2020 году и 12% в 2021 году), и в возрасте старше 61 года (15,8% в 2019 году, 16% в 2020 году и 11,5% в 2021 году). Увеличился удельный вес пациентов у которых был выявлен поздний сифилис в возрастном периоде от 36 до 45 лет (26,1% в 2019 году и 29,2% в 2021 году), а также от 46 до 55 лет (24% за 2019 год и 31,5% за 2020 год).

За период с 2019 по 2021 год отмечается рост относительного количества случаев сочетанной патологии поздних форм сифилиса с вирусными гепатитами В и С — в 2019 году больные с гепатитами составляли 12,7% от всех пациентов с поздними формами сифилиса, в 2020 году — 17,1%, в 2021 году — 16,7%.

В период с 2020 по 2021 год наблюдается снижение относительного количества случаев сочетания поздних форм сифилиса с ВИЧ-инфекцией (11,8% в 2020 году и 9,9% в 2021 году).

Выводы: увеличение относительного количества позднего скрытого сифилиса, который способен перейти в поздние формы нейросифилиса и кардиосифилиса, требует более тщательного обследования пациентов дерматовенерологами, а так же специалистами смежных профилей. Наиболее раннее выявление и лечение пациентов с поздними формами сифилиса предупреждает необходимость в дальнейшем дорогостоящем лечении в специализированных стационарах.

Литература

1. Федеральная служба государственной статистики