

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ COVID-19

© Моргунов Владислав Станиславович, Вышегородцева Зоя Игоревна

Научный руководитель: к.м.н., доцент Поздняк Вера Владимировна
Кафедра психиатрии и наркологии
Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет

Контактная информация: Моргунов Владислав Станиславович — студент 4 курса, иностранный факультет.
E-mail: asdfaster@mail.ru

Ключевые слова: COVID-19, психическое расстройство.

Актуальность исследования: при инфекционных заболеваниях возможно развитие экзогенных психических расстройств [3]. Коронавирусная инфекция имеет прямое влияние на развитие неврологических расстройств и косвенное на развитие психических расстройств. Основной мишенью, поражаемой при заболевании COVID-19, оказывается респираторная система, но болезнь затрагивает не только органы дыхания. Более чем у трети больных наблюдается выраженная неврологическая симптоматика и косвенное развитие психических расстройств. Согласно исследованиям, у 12,84% после перенесенного COVID-19 диагностируются различные психические расстройства [2].

Цель исследования: демонстрация корреляции заражения коронавирусной инфекцией и впервые возникшего психического расстройства.

Материалы и методы: был проведен анализ историй болезни пациентов, находившихся на лечении в ГБУЗ ЛО «Тосненской межрайонной клинической больнице». Возраст исследуемых варьируется в интервале 18–93 лет. Всего было изучено 1429 историй пациентов, попавших в стационар и имеющих диагноз коронавирусная инфекция. 848 принадлежало женскому полу, 581- мужскому. Посредством анализа медицинских карт были выявлены психические расстройства, в виде: делирий, агрессия, нарушение сна, тревога, на основе которых проведен статистический анализ полученных результатов.

Результаты: у 36% (519) поступивших в стационар, были выявлены такие расстройства, как: делирий, агрессия, нарушение сна, тревога.

Тревога, с сопутствующими паническими атаками была диагностирована у 35,9%(209) мужчин, у 28,4% (241) женщин. Нарушение сна и тревога диагностирована у 3% (32) женщин, у мужчин не выявлено; делирий, агрессия и тревога: мужчины — 0, женщины — 1,5% (13); только нарушение сна: мужчины — 0, женщины — 1% (10); все нарушения диагностированы (делирий, агрессия, нарушение сна, тревога): мужчины — 0, женщины — 0,35% (3).

Выводы: заболевание COVID-19 оставляет свой след в любой сфере медицины [1]. Требуется расширение статистики и включение полных данных анамнеза, включая отягощенную наследственность, сопутствующие заболевания. Промежуточные результаты демонстрируют определенную вероятность развития после коронавирусной инфекции психических расстройств.

Литература

1. Мосолов С.Н. «Проблемы психического здоровья в условиях пандемии COVID-19» // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 2020 Т. 120 № 5 С. 7–15.
2. Осколкова С.Н. Амбулаторные случаи психических нарушений в период коронавирусной пандемии COVID-19. // Психиатрия. 2020 Т. 18, № 3 С. 49–57.
3. Гречаный С.В., Ильичев А.Б., Поздняк В.В., Кошавцев А.Г., Шишков В.В., Хуторянская Ю.В. Частная психиатрия. Санкт-Петербург, 2020. Сер. Библиотека педиатрического университета, стр. 11