

КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ, УСУГУБЛЯЮЩАЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ГЕМОЛИТИЧЕСКИМИ И АПЛАСТИЧЕСКИМИ АНЕМИЯМИ

© *Бартось Вера Николаевна*

Государственное Учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации». 223027, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, район д. Юхновка, Колодищанский с/с, 93. E-mail: bartos-ag@mail.ru

Ключевые слова: Гемолитическая анемия; апластическая анемия; желчнокаменная болезнь; гиперкортицизм.

Введение. Наиболее частой цитопенией в любой возрастной популяции, особенно у детей, является анемический синдром. Распространенность сопутствующей патологии у пациентов с анемиями на момент постановки диагноза составляет по разным данным 97,4%

Цель исследования. Изучить патологию, усугубляющую ограничение жизнедеятельности при анемическом синдроме.

Материалы и методы. Было проведено клинично-функциональное и клинично-экспертное обследование 39 детей в возрасте от 1 года до 18 лет ($59,0 \pm 7,9\%$ мальчики и $41,0 \pm 7,9\%$ девочки) с цитопеническим синдромом вследствие анемии.

Для оценки полученных результатов применялись методы описательной статистики: абсолютное число, относительная величина (р), стандартная ошибка относительных величин (m_p).

Результаты исследования. В ходе анализа установлено, что наиболее часто ($61,5 \pm 7,8\%$) встречаемой патологией у детей с анемическим синдромом являлись гемолитические анемии. Несколько реже ($37,5 \pm 7,8\%$) к анемическому синдрому приводили апластические анемии.

Среди сопутствующей патологии у пациентов с ГА случаи болезней и патологических состояний эндокринной системы и нарушения обмена веществ выявлены у $37,8 \pm 10,1\%$, из числа которых доминировал гиперкортицизм ($44,5\%$) и у $67,0 \pm 12,6\%$ детей с АА, среди которых преобладало ожирение ($30,0\%$).

Среди детей с ГА сопутствующие болезни и патологические состояния органов пищеварения отмечались у $50,0 \pm 10,4\%$ детей, из числа которых в $66,7\%$ случаев доминировала желчнокаменная болезнь (ЖКБ), а у пациентов с АА ЖКБ встречалась только в $20,1 \pm 10,7\%$, из числа которых в 100% был хронический гастрит. Это обусловлено тем,

что ЖКБ имеет высокий риск развития при гемолитических анемиях, обусловленный длительно персистирующей гипербилирубинемией.

У $25,2 \pm 9,1\%$ детей с ГА отмечались болезни и патологические состояния нервной системы (из них $33,3\%$ случаев — вегето-сосудистая дистония), а у детей с АА данная сопутствующая патология встречалась только в $1 (6,7 \pm 6,7\%)$ случае.

Болезни и патологические состояния системы кровообращения отмечались у $25,2 \pm 9,1\%$ детей с ГА (среди которых преобладали ($83,3\%$) малые аномалии сердца), и у $13,4 \pm 9,1\%$ детей с АА (в $100,0\%$ случаев — нарушение ритма и проводимости сердца).

Болезни и патологические состояния верхних дыхательных путей среди детей с АА отмечались в $33,5 \pm 12,6\%$ случаев (из них в $60,0\%$ случаев — вазомоторный ринит), и в $21,0 \pm 8,5\%$ случаев среди детей с ГА (из них в $60,0\%$ случаев — гипертрофия небных миндалин).

У $13,4 \pm 9,1\%$ детей, страдающих АА и у $8,4 \pm 5,7\%$ детей, страдающих ГА отмечались болезни и патологические состояния мочеполовой системы.

Болезни и патологические состояния костно-мышечной системы встречались в $13,4 \pm 9,1\%$ случаев у детей с АА и в $8,4 \pm 5,8\%$ — с ГА.

Такие классы сопутствующих заболеваний, как расстройства речи и языка, болезни и патологические состояния глаза и его придаточного аппарата, болезни и патологические состояния уха и сосцевидного отростка были представлены единичными случаями.

Заключение. Таким образом, у детей с ГА наиболее частой патологией, усугубляющей ограничение жизнедеятельности были болезни и патологические состояния органов пищеварения ($50,0 \pm 10,4\%$ случаев), болезни и патоло-

гические состояния эндокринной системы и нарушения обмена веществ ($37,8 \pm 10,1\%$), болезни и патологические состояния нервной системы ($25,2 \pm 9,1\%$), болезни и патологические состояния системы кровообращения ($25,2 \pm 9,1\%$), а у детей с АА — болезни и пато-

логические состояния эндокринной системы и нарушения обмена веществ ($67,0 \pm 12,6\%$), болезни и патологические состояния верхних дыхательных путей ($33,5 \pm 12,6\%$), болезни и патологические состояния органов пищеварения ($20,1 \pm 10,7\%$).